

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе

**МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ КОЛЛЕДЖ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
(ГБПОУ РО «РКРИПТ»)**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ**

по дисциплине

ОП.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ

для специальности

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

Квалификация выпускника:
специалист по компьютерным системам

Составитель:
Кузнецова Е.О.,
преподаватель высш. квал. кат.
ГБПОУ РО «РКРИПТ»,
Сельцина Н.В.
преподаватель высш. квал. кат.
ГБПОУ РО «РКРИПТ»

2024, г. Ростов-на-Дону

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Практическая работа № 1. Выполнение операций над матрицами.
2. Практическая работа №2. Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера и методом Гаусса.
3. Практическая работа №3. Нахождение обратной матрицы. Решение систем линейных уравнений матричным методом
4. Практическая работа №4. Действия над комплексными числами в алгебраической, тригонометрической и показательной формах.
5. Практическая работа №5. Векторное и смешанное произведение векторов, его практическое применение.
6. Практическая работа №6. Нахождение различных видов уравнений прямой
7. Практическая работа №7. Решение задач по теме «Кривые второго порядка».
8. Практическая работа №8. Вычисление пределов. Нахождение точек разрыва функции
9. Практическая работа №9. Дифференцирование простых и сложных функций.
10. Практическая работа №10. Исследование функций с помощью производной. Построение графиков функций.
11. Практическая работа №11. Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными и линейных дифференциальных уравнений первого порядка.
12. Практическая работа №12. Вычисление интегралов.
13. Практическая работа №13. Решение практических задач с применением свойств интегралов.

ВВЕДЕНИЕ

Практические занятия по учебной дисциплине ОП.01 Элементы высшей математики составляют важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки и направлены на подтверждение теоретических положений и формирование практических умений и практического опыта:

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;
- использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена информацией;
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;
- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и вычислительной техники;
- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;
- применять графические редакторы для создания и редактирования изображений;
- применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления документов и презентаций
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ;
- основные положения и принципы построения системы обработки и передачи информации;
- устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи информации;
- методы и приемы обеспечения информационной безопасности;
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем;
- основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных технологий, их эффективность

Практические занятия относятся к основным видам учебных занятий.

Выполнение студентами практических работ направлено:

- на обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по конкретным темам дисциплин;
- формирование умений применять полученные знания на практике;
- реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности;
- развитие интеллектуальных умений (аналитических, проектировочных, конструкторских и др.) у будущих специалистов;
- выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.

Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование практических умений – профессиональных (выполнять определенные действия, операции, необходимые в последующем в профессиональной деятельности) или учебных (решать задачи по математике, физике, химии, информатике и др.), необходимых в последующей учебной деятельности.

Содержанием практических занятий по дисциплине являются решение разного рода задач, в том числе профессиональных, выполнение вычислений, расчетов, чертежей, работа с измерительными приборами, оборудованием, аппаратурой, работа с нормативными документами, инструктивными материалами, справочниками, составление проектной, плановой и другой технической и специальной документации и другое.

Содержание практических занятий охватывают весь круг профессиональных умений, на подготовку к которым ориентирована данная дисциплина, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе курсового проектирования, практикой по профилю специальности и преддипломной практикой.

Практическое занятие проводится в учебных кабинетах или специально оборудованных помещениях (площадках). Продолжительность занятия – не менее 2-х академических часов. Необходимыми структурными элементами занятия, помимо самостоятельной деятельности студентов, являются инструктаж, проводимый преподавателем, а также организация обсуждения итогов выполнения работы.

Все студенты, связанные с работой в лаборатории, обязаны пройти инструктаж по безопасному выполнению работ, о чем расписываются в журнале инструктажа по технике безопасности.

Выполнению практических работ предшествует проверка знаний студентов, их теоретической готовности к выполнению задания.

Практические работы студенты выполняют под руководством преподавателя. При проведении практических занятий учебная группа может делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек. Объем заданий для практических занятий спланирован с расчетом, чтобы за отведенное время они могли быть выполнены качественно большинством студентов.

Формы организации работы обучающихся на практических занятиях: фронтальная, групповая и индивидуальная.

При фронтальной форме организации занятий все студенты выполняют одновременно одну и ту же работу. При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется бригадами по 2 - 5 человек. При индивидуальной форме организации занятий каждый студент выполняет индивидуальное задание.

Отчет по практической работе представляется в печатном виде в формате, предусмотренном шаблоном отчета по практической, лабораторной работе. Защита отчета проходит в форме доклада обучающегося по выполненной

работе и ответов на вопросы преподавателя.

Оценки за выполнение практических занятий могут выставляться по пятибалльной системе или в форме зачета и учитываться как показатели текущей успеваемости студентов.

Критерии оценки практических работ.

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей.

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта.

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, позволяет получить правильные результаты и выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.

Практическое занятие № 1

Тема: Выполнение операций над матрицами.

1. Цель занятия: научиться производить операции над матрицами и определителями.

2. Перечень справочной литературы:

2.1. Конспект лекций.

2.2. Омельченко В.П., Курбатова Э.В., Математика - учебное пособие, Ростов – на – Дону; Феникс, 2021;

2.3. Горбенко Н.Н. Линейная алгебра – учебное пособие для студентов 2-го курса по разделу дисциплины «Математика»;

3. Краткие теоретические сведения:

Матрицей называется множество чисел, образующих прямоугольную таблицу, которая содержит m строк и n столбцов. Для записи матрицы используется следующее обозначение:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Любое число такого массива называется *элементом* матрицы.

Ряд чисел, расположенных в матрице горизонтально, называется *строкой* матрицы, а вертикально – *столбцом*.

Количество строк в матрице обычно обозначается m , количество столбцов – n .

Количество элементов в матрице называется *размерностью* матрицы и обозначается $m \times n$.

Если число строк матрицы не равно числу столбцов ($m \neq n$), то матрица называется *прямоугольной*. Таковы, например, матрицы

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & b_{14} & b_{15} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & b_{24} & b_{25} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} & b_{34} & b_{35} \end{pmatrix}.$$

Если число строк равно числу столбцов ($m = n$), то матрица называется *квадратной*. Например, квадратными являются матрицы

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & b_{14} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & b_{24} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} & b_{34} \\ b_{41} & b_{42} & b_{43} & b_{44} \end{pmatrix}.$$

Число строк или столбцов квадратной матрицы называется ее *порядком*. Так, в последнем примере порядок матрицы A равен 2, а порядок матрицы B

равен 4.

Рассмотрим квадратную матрицу порядка n :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Диагональ, содержащая элементы $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$, называется *главной*, а диагональ, содержащая элементы $a_{1n}, a_{2,n-1}, \dots, a_{n1}$, - *побочной* (или вспомогательной).

Единичной матрица обозначается буквой E :

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Нулевая матрица обозначается так:

$$0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}.$$

Умножение квадратных матриц второго порядка.

Пусть
$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}.$$

Произведением этих матриц называется матрица

$$C = AB = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{pmatrix}.$$

Для прямоугольных матриц справедливы следующие правила:

- 1) умножение матрицы A на матрицу B имеет смысл только в том случае, когда число столбцов матрицы A равно числу строк матрицы B ;
- 2) в результате умножения двух прямоугольных матриц получается матрица, содержащая столько строк, сколько в первой матрице, и столько столбцов, сколько во второй матрице.

Определителем (или детерминантом) второго порядка называется число:

$$\triangle = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

Диагональ, содержащая элементы, $a_{11}a_{22}$, называется **главной**, а диагональ, содержащая элементы $a_{12}a_{21}$ – **побочной** (или вспомогательной).

Определитель второго порядка вычисляется по правилу: **из произведения элементов главной диагонали вычитают произведение элементов побочной диагонали.**

Определителем (или детерминантом) третьего порядка называется число:

$$\triangle = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} a_{33} + a_{21} a_{32} a_{13} + a_{12} a_{23} a_{31} - a_{31} a_{22} a_{13} - a_{21} a_{33} a_{12} - a_{11} a_{23} a_{32}$$

4. Решение типовых примеров:

1. Сложить матрицы А и В, если:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 6 & -4 & 5 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 9 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}; C = A + B = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 12 \\ 8 & 0 & 11 \end{pmatrix}.$$

Складывать можно только матрицы, имеющие одинаковое строение: или прямоугольные типа $m \times n$, или квадратные равные порядка n .

2. Сложить матрицы А и В, если

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -4 \end{pmatrix};$$

Решение. Здесь А и В – квадратные матрицы второго порядка. Складывая их соответствующие элементы, получим

$$C = A + B = \begin{pmatrix} 2-1 & 4+3 \\ -1+1 & 3-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Для любой матрицы А существует матрица $-A$, такая, что $A+(-A)=O$, т. е. матрица, *противоположная* А.

3. Умножить матрицу $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 0 & 5 & -3 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ на число $k = 3$.

Решение. Умножая каждый элемент матрицы А на 3 получим:

$$3A = \begin{pmatrix} 6 & -3 & 12 \\ 0 & 15 & -9 \\ -6 & 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

4. Найти линейную комбинацию $3A-2B$, если

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 0 \\ -1 & 5 & 1 \\ 0 & 3 & -7 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -2 \\ 0 & -3 & 5 \\ 2 & 0 & -4 \end{pmatrix}.$$

Решение. Сначала находим произведения A на $k=3$ и B на $k=-2$:

$$3A = \begin{pmatrix} 6 & -12 & 0 \\ -3 & 15 & 3 \\ 0 & 9 & -21 \end{pmatrix}, \quad -2B = \begin{pmatrix} -8 & 2 & 4 \\ 0 & 6 & -10 \\ -4 & 0 & 8 \end{pmatrix}.$$

Теперь найдем сумму полученных матриц:

$$3A-2B = \begin{pmatrix} 6-8 & -12+2 & 0+4 \\ -3+0 & 15+6 & 3-10 \\ 0-4 & 9+0 & -21+8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -10 & 4 \\ -3 & 21 & -7 \\ -4 & 9 & -13 \end{pmatrix}.$$

5. Найти произведение матриц A и B , если

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Решение. Найдем каждый элемент матрицы-произведения:

$$c_{11} = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + a_{13}b_{31} = 3 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 6;$$

$$c_{12} = a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + a_{13}b_{32} = 3 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 0 = 2;$$

$$c_{13} = a_{11}b_{13} + a_{12}b_{23} + a_{13}b_{33} = 3 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 = -1;$$

$$c_{21} = a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} + a_{23}b_{31} = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 = 6;$$

$$c_{22} = a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} + a_{23}b_{32} = 2 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 0 = 1;$$

$$c_{23} = a_{21}b_{13} + a_{22}b_{23} + a_{23}b_{33} = 2 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 1;$$

$$c_{31} = a_{31}b_{11} + a_{32}b_{21} + a_{33}b_{31} = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 1 = 8;$$

$$c_{32} = a_{31}b_{12} + a_{32}b_{22} + a_{33}b_{32} = 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 0 = -1;$$

$$c_{33} = a_{31}b_{13} + a_{32}b_{23} + a_{33}b_{33} = 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 = 4.$$

Следовательно,

$$C = \begin{pmatrix} 6 & 2 & -1 \\ 6 & 1 & 1 \\ 8 & -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

6. Найти матрицу $C=A \times B$, если

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix}_{2 \times 3}; \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \\ 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{3 \times 3}$$

$$C=A \times B = \begin{pmatrix} 3 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 1 \cdot 4 & 3 \cdot 3 + 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 & 3 \cdot 0 + 2 \cdot 3 + 1 \cdot 0 \\ 4 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 2 \cdot 4 & 4 \cdot 3 + 0 \cdot 1 + 2 \cdot 0 & 4 \cdot 0 + 0 \cdot 3 + 2 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 11 & 6 \\ 12 & 12 & 0 \end{pmatrix}_{2 \times 3}.$$

7. Найти произведение АВ, если

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 3 & 7 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Решение.

$$AB = \begin{pmatrix} 0 \cdot 3 + (-1) \cdot 2 + 2 \cdot 1 & 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 + 2 \cdot 0 \\ 2 \cdot 3 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 & 2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \\ 3 \cdot 3 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 & 3 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \\ 3 \cdot 3 + 7 \cdot 2 + 1 \cdot 1 & 3 \cdot 1 + 7 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 9 & 3 \\ 10 & 3 \\ 24 & 10 \end{pmatrix}$$

8. Вычислить определитель второго порядка:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = 4 - 6 = -2$$

$$\begin{vmatrix} 7 & 14 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = -14 - 42 = -56$$

9. Вычислить определители третьего порядка.

$$\text{I способ: } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} + 3 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} = 1 \cdot (45 - 48) - 2 \cdot (36 - 42) + 3 \cdot (32 - 35) = 0$$

$$\text{II способ: } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 6 \\ 3 & 8 & 9 \end{vmatrix} = 1 \cdot 5 \cdot 9 + 2 \cdot 6 \cdot 7 + 4 \cdot 3 \cdot 8 - 7 \cdot 5 \cdot 3 - 4 \cdot 2 \cdot 9 - 6 \cdot 8 \cdot 1 = 0$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 3 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 3 \cdot 5 \cdot 3 + 2 \cdot 3 \cdot 3 + 2 \cdot 4 \cdot 1 - 1 \cdot 5 \cdot 3 - 2 \cdot 2 \cdot 3 - 3 \cdot 3 \cdot 4 = 45 + 18 + 8 - 15 - 12 - 36 = 71 - 63 = 8$$

5. Задания:

Произвести операции над матрицами.

Вычислить определители.

6. Порядок выполнения работы:

6.1. Ознакомиться с литературой и изучить теоретические сведения по темам «Матрица» и «Определители».

6.2. Выписать в тетрадь свой вариант задания.

6.3. Выполнить задание.

7. Содержание отчета.

7.1. Тема и цель работы.

7.2. Решение заданий.

7.5. Выводы, ответ.

7.6. Ответы на контрольные вопросы.

8. Контрольные вопросы.

8.1. Определение матрицы; виды матриц.

8.2. Правила сложения и умножения матриц.

8.3. Определение определителей 2 и 3 порядков.

8.4. Способы вычисления определителей 3 порядка.

Задания для самостоятельной работы:

Даны матрицы:

Вариант 1.

1. Найти линейную комбинацию матриц $C = 2A + 3B$;

2. Найти произведение матриц $A * B$;

3. Вычислить определители матриц A и B :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 7 & -5 \\ 4 & 3 & 1 \\ -3 & 6 & -2 \end{pmatrix} \text{ и } B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -2 & 4 & 5 \\ 6 & 2 & -7 \end{pmatrix}$$

Вариант 2.

1. Найти линейную комбинацию матриц $C = 3A - 2B$;

2. Найти произведение матриц $A * B$;

3. Вычислить определители матриц A и B :

$$A = \begin{pmatrix} 6 & -4 & 0 \\ 4 & 3 & -2 \\ 5 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ и } B = \begin{pmatrix} -5 & 4 & 1 \\ 0 & -3 & 2 \\ 6 & 1 & 7 \end{pmatrix}$$

Вариант 3.

1. Найти линейную комбинацию матриц $C = 4A + 2B$;

2. Найти произведение матриц $A * B$;

3. Вычислить определители матриц A и B :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ -5 & 0 & 6 \end{pmatrix} \text{ и } B = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 3 \\ -5 & 6 & -2 \\ 4 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

Вариант 4.

1. Найти линейную комбинацию матриц $C = 2A - 4B$

2. Найти произведение матриц $A * B$;

3. Вычислить определители матриц A и B :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \text{ и } B = \begin{pmatrix} 2 & -5 & 4 \\ 7 & 0 & -3 \\ -3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Практическое занятие №2

Тема: Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера и методом Гаусса.

Цель работы: получить практические навыки решения систем линейных уравнений различными способами.

1. Краткие теоретические сведения

Вычисление определителей 2-го порядка.

Рассмотрим определитель второго порядка:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

Правило вычисления определителя второго порядка:

определитель второго порядка равен **произведению элементов главной диагонали минус произведение элементов побочной диагонали**, т.е.

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}.$$

Вычисление определителей 3-го порядка.

Определитель 3-го порядка вычисляют двумя способами: **по правилу треугольников** и **разложением определителя по элементам какой-либо строки (столбца)**

Правило треугольников.

В этом случае значение определителя вычисляют как сумму шести слагаемых, каждое из которых представляет собой произведение трёх элементов определителя, выбираемых по следующему правилу: три произведения элементов, стоящих на главной диагонали и в вершинах двух треугольников

$$\begin{vmatrix} \otimes & \otimes & \otimes \\ \otimes & \otimes & \otimes \\ \otimes & \otimes & \otimes \end{vmatrix}$$

берутся со знаком +,

а три произведения элементов, стоящих на побочной диагонали и в вершинах двух других треугольников

$$\begin{vmatrix} \otimes & \otimes & \otimes \\ \otimes & \otimes & \otimes \\ \otimes & \otimes & \otimes \end{vmatrix}$$

берутся со знаком минус, т.е. вычисление определителя выполняется по следующей схеме:

$$\begin{vmatrix} \otimes & \otimes & \otimes \\ \otimes & \otimes & \otimes \\ \otimes & \otimes & \otimes \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \otimes & \otimes & \otimes \\ \otimes & \otimes & \otimes \\ \otimes & \otimes & \otimes \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} \otimes & \otimes & \otimes \\ \otimes & \otimes & \otimes \\ \otimes & \otimes & \otimes \end{vmatrix}$$

Разложение определителя по элементам какой-либо строки (столбца).

В данном случае значение определителя находят как сумму произведений элементов какой-либо строки (столбца) определителя на их **алгебраические дополнения**:

$$\Delta = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + a_{i3}A_{i3} -$$

разложение по элементам i -ой строки; $i = 1;2;3$.

$$\Delta = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + a_{3j}A_{3j} -$$

разложение по элементам j -ого столбца; $j = 1;2;3$.

Метод Крамера решения систем линейных уравнений.

Решение квадратной системы n линейных уравнений с n неизвестными в этом случае находят по формулам Крамера:

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}, x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}, \dots, x_n = \frac{\Delta_n}{\Delta},$$

где

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \dots a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} \dots a_{2n} \\ \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} \dots a_{nn} \end{vmatrix} -$$

основной определитель системы,

$\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$ - вспомогательные определители, получаемые из основного заменой j -го столбца на столбец свободных членов.

Если основной определитель системы $\Delta \neq 0$, то система имеет единственное решение (**совместна и определена**).

Если основной определитель и вспомогательные определители равны 0, т.е.

$$\Delta = \Delta_1 = \Delta_2 = \dots = \Delta_n,$$

то система имеет бесконечное множество решений (**совместна и не определена**).

Если основной определитель системы $\Delta = 0$ и какой-либо вспомогательный определитель отличен от 0, то система **несовместна**, т.е. решений не имеет.

Метод Гаусса решения систем линейных уравнений.

Суть метода Гаусса состоит в следующем:

- а) Составляют расширенную матрицу системы (записывают матрицу коэффициентов, через вертикальную черту от неё записывают столбец свободных членов)
- б) С помощью элементарных преобразований основную матрицу системы (матрицу коэффициентов) приводят к единичному виду. Тогда в столбце свободных членов получают решение системы.

2. Методика решения типовых задач

2.1 Пример 1. Вычислить определитель $\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 7 \end{vmatrix}$.

Решение. По правилу вычисления определителя 2-го порядка имеем:

$$\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 7 \end{vmatrix} = 2 \cdot 7 - 3 \cdot 4 = 14 - 12 = 2.$$

Пример 2. Вычислить определитель $\Delta = \begin{vmatrix} \log_2 8 & \log_{\frac{1}{3}} 27 \\ \log_5 1 & \lg 1000 \end{vmatrix}$.

Решение. Заменяем логарифмы, являющиеся элементами определителя, их значениями:

$$\log_2 8 = 3, \quad \log_{\frac{1}{3}} 27 = -3, \quad \log_5 1 = 0, \quad \lg 1000 = 3,$$

тогда получим

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & -3 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 3 \cdot 3 - 0 \cdot (-3) = 9.$$

Пример 3. Вычислить определитель 3-го порядка $\begin{vmatrix} 2 & 3 & 5 \\ -1 & -2 & 3 \\ 2 & 4 & 9 \end{vmatrix}$ по правилу

треугольников:

Решение.

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 5 \\ -1 & -2 & 3 \\ 2 & 4 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 5 \\ -1 & -2 & 3 \\ 2 & 4 & 9 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 2 & 3 & 5 \\ -1 & -2 & 3 \\ 2 & 4 & 9 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-2) \cdot 9 + 3 \cdot 3 \cdot 2 + (-1) \cdot 4 \cdot 5 -$$

$$- (2 \cdot (-2) \cdot 5 + (-1) \cdot 3 \cdot 9 + 4 \cdot 3 \cdot 2) = -36 + 18 - 20 + 20 + 27 - 24 = -15.$$

Пример 4. Вычислить определитель 3-го порядка $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -3 & 1 \\ 4 & -1 & -5 \end{vmatrix}$ разложением

по элементам какой-либо строки (столбца).

Решение. Вычислим данный определитель разложением по элементам первой строки:

$$\Delta = 1 \cdot \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ -1 & -5 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & -5 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} = (-15 + 1) - (-10 - 4) + (-2 + 12) = -14 + 14 + 10 = 10.$$

2.2 Пример 5. Решить систему уравнений методом Крамера

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 8, \\ -2x_1 + 3x_2 - 3x_3 = -5, \\ 3x_1 - 4x_2 + 5x_3 = 10 \end{cases}$$

Решение. Составим и вычислим основной и вспомогательные определители системы разложением по элементам первой строки:

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -2 & 3 & -3 \\ 3 & -4 & 5 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 3 & -3 \\ -4 & 5 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} -2 & -3 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 3 & -4 \end{vmatrix} = \\ &= 15 - 12 - 2(-10 + 9) - 1 = 4. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta_1 &= \begin{vmatrix} 8 & 2 & 1 \\ -5 & 3 & -3 \\ 10 & -4 & 5 \end{vmatrix} = 8 \begin{vmatrix} 3 & -3 \\ -4 & 5 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} -5 & -3 \\ 10 & 5 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -5 & 3 \\ 10 & -4 \end{vmatrix} = \\ &= 8(15 - 12) - 2(-25 + 30) + (20 - 30) = 24 - 10 - 10 = 4. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta_2 &= \begin{vmatrix} 1 & 8 & 1 \\ -2 & -5 & -3 \\ 3 & 10 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -5 & -3 \\ 10 & 5 \end{vmatrix} - 8 \begin{vmatrix} -2 & -3 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -2 & -5 \\ 3 & 10 \end{vmatrix} = \\ &= -25 + 30 - 8(-10 + 9) - 20 + 15 = 5 + 8 - 5 = 8. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta_3 &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 8 \\ -2 & 3 & -5 \\ 3 & -4 & 10 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & -5 \\ -4 & 10 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} -2 & -5 \\ 3 & 10 \end{vmatrix} + 8 \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 3 & -4 \end{vmatrix} = \\ &= 30 - 20 - 2(-20 + 15) + 8(8 - 9) = 10 + 10 - 8 = 12. \end{aligned}$$

По формулам Крамера находим неизвестные системы:

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{4}{4} = 1, \quad x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{8}{4} = 2, \quad x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{12}{4} = 3.$$

Ответ: (1;2;3)

2.3 Пример 6. Решить методом Гаусса систему уравнений:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 7, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 13, \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 = 4 \end{cases}$$

Решение. Составим расширенную матрицу системы:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 7 \\ 1 & 2 & 3 & 13 \\ 2 & -3 & 1 & 4 \end{array} \right).$$

Для того, чтобы привести основную матрицу к диагональному виду, будем обнулять все диагональные элементы с помощью элементарных преобразований.

Например, возьмём сначала в качестве ведущего элемента $a_{11} = 1$ и обнулим элементы первого столбца из второй и третьей строки с помощью следующих элементарных преобразований:

$$c_2 - c_1, \quad c_3 - 2c_1,$$

тогда получим:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 7 \\ 1 & 2 & 3 & 13 \\ 2 & -3 & 1 & 4 \end{array} \right) \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 7 \\ 0 & 3 & 1 & 6 \\ 0 & -1 & -3 & -10 \end{array} \right).$$

Теперь в качестве ведущего элемента удобнее выбрать элемент $a_{32} = -1$ и обнулить элементы второго столбца второй и первой строки с помощью следующих элементарных преобразований:

$$c_1 - c_3, \quad c_2 + 3c_3,$$

после чего получим

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 7 \\ 0 & 3 & 1 & 6 \\ 0 & -1 & -3 & -10 \end{array} \right) \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 5 & 17 \\ 0 & 0 & -8 & -24 \\ 0 & -1 & -3 & -10 \end{array} \right).$$

Вторую строку последней матрицы можно разделить на -8, а третью строку на -1, тогда имеем

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 5 & 17 \\ 0 & 0 & -8 & -24 \\ 0 & -1 & -3 & -10 \end{array} \right) \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 5 & 17 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 10 \end{array} \right).$$

Теперь выбираем в качестве ведущего элемента $a_{23} = 1$ и обнулим элементы третьего столбца первой и третьей строки с помощью следующих преобразований:

$$c_3 - 3c_2, \quad c_1 - 5c_2,$$

тогда получим:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 5 & 17 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 10 \end{array} \right) \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

Для того чтобы привести основную матрицу к единичному виду и получить окончательный ответ, переставим местами вторую и третью строку матрицы:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right).$$

Ответ: (2; 1; 3).

3. Порядок выполнения практической работы

- 3.1 Изучить краткие теоретические сведения.
- 3.2 Решить задания своего варианта (Приложение)
- 3.3 Ответить на контрольные вопросы

4. Содержание отчёта

- 4.1 Тема и цель работы.
- 4.2 Решение заданий.
- 4.3 Ответы на контрольные вопросы.

5. Контрольные вопросы

- 5.1 Что называется определителем?
- 5.2 Что называется элементами определителя?
- 5.3 Что называется порядком определителя?
- 5.4 Сформулируйте правило вычисления определителя второго порядка.
- 5.5 Что называется минором элемента определителя?
- 5.6 Что называется алгебраическим дополнением элемента определителя?
- 5.7 Какими способами вычисляются определители третьего порядка. В чём заключается каждый из этих способов?
- 5.8 Что значит решить систему линейных уравнений?
- 5.9 Что представляет собой решение системы n линейных уравнений с n неизвестными?
- 5.10 Как называется система, имеющая решения?
- 5.11 Как называется система, имеющая одно решение?
- 5.12 Как называется система, имеющая более одного решения?
- 5.13 Как называется система, не имеющая ни одного решения?
- 5.14 Запишите формулы Крамера для решения систем линейных уравнений.
- 5.15 В чём заключается метод Гаусса решения систем линейных уравнений?

6. Список литературы

6.1 Алексеева Е.В. Основы линейной алгебры: учебное пособие для студентов 2-го курса технических специальностей по разделу дисциплины «Элементы высшей математики», «Математика».

6.2 Конспект теоретических занятий

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВАРИАНТ 1	ВАРИАНТ 2
<p>№1. Вычислить определители 2-го порядка:</p> $\begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 5 & 7 \\ 3 & 0 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 15 & -1 \\ -2 & 4 \end{vmatrix}$ <p>№2. Вычислить определитель 3-го порядка разложением по элементам какой-либо строки (столбца) и правилу треугольников:</p> $\begin{vmatrix} -4 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 7 \end{vmatrix}$ <p>№3. Решить систему уравнений методом Крамера, методом Гаусса:</p> $\begin{cases} -3x + y + 3z = 10, \\ -2y - z = -4, \\ 2x - y + 3z = 3 \end{cases}$	<p>№1. Вычислить определители 2-го порядка:</p> $\begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 5 & 3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} -4 & -3 \\ 6 & 0 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} -4 & -3 \\ 8 & 6 \end{vmatrix}$ <p>№2. Вычислить определитель 3-го порядка разложением по элементам какой-либо строки (столбца) и правилу треугольников:</p> $\begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -4 \end{vmatrix}$ <p>№3. Решить систему уравнений методом Крамера, методом Гаусса:</p> $\begin{cases} 2x_1 - x_2 - 6x_3 = -15, \\ 3x_1 - x_2 + x_3 = -2, \\ -2x_1 + 3x_3 = 7 \end{cases}$
ВАРИАНТ 3	ВАРИАНТ 4
<p>№1. Вычислить определители 2-го порядка:</p> $\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 0 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} -5 & -2 \\ -10 & -4 \end{vmatrix}$ <p>№2. Вычислить определитель 3-го порядка разложением по элементам какой-либо строки (столбца) и правилу треугольников:</p> $\begin{vmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -3 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 5 \end{vmatrix}$	<p>№1. Вычислить определители 2-го порядка:</p> $\begin{vmatrix} 13 & 12 \\ 5 & 5 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 2 & -8 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} -18 & 30 \\ 3 & -5 \end{vmatrix}.$ <p>№2. Вычислить определитель 3-го порядка разложением по элементам какой-либо строки (столбца) и правилу треугольников:</p> $\begin{vmatrix} 4 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & -4 \\ -5 & 2 & 0 \end{vmatrix}.$

<p>№3. Решить систему уравнений методом Крамера, методом Гаусса:</p> $\begin{cases} -2x_1 + x_2 - 3x_3 = -4, \\ 4x_1 + 7x_2 - 2x_3 = -6, \\ x_1 - 8x_2 + 5x_3 = 1 \end{cases}$	<p>№3. Решить систему уравнений методом Крамера, методом Гаусса:</p> $\begin{cases} x_1 - 3x_2 + x_3 = -2, \\ x_1 - 2x_2 - 4x_3 = -11, \\ -2x_1 - x_2 = 1 \end{cases}$
ВАРИАНТ 5	ВАРИАНТ 6
<p>№1. Вычислить определители 2-го порядка:</p> $\begin{vmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 5 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 3 & 7 \\ -1 & 0 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 21 & 4 \\ -2 & 1 \end{vmatrix}$ <p>№2. Вычислить определитель 3-го порядка разложением по элементам какой-либо строки (столбца) и правилу треугольников:</p> $\begin{vmatrix} -1 & 3 & 6 \\ 2 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$ <p>№3. Решить систему уравнений методом Крамера, методом Гаусса:</p> $\begin{cases} x_1 + 7x_2 - 2x_3 = 3, \\ 3x_1 + 5x_2 + x_3 = 5, \\ -2x_1 + 5x_2 - 5x_3 = -4 \end{cases}$	<p>№1. Вычислить определители 2-го порядка:</p> $\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 14 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 2 & 10 \\ -1 & 3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 5 & -6 \end{vmatrix}$ <p>№2. Вычислить определитель 3-го порядка разложением по элементам какой-либо строки (столбца) и правилу треугольников:</p> $\begin{vmatrix} 5 & 2 & = 4 \\ -1 & -1 & 1 \\ -2 & 3 & 0 \end{vmatrix}$ <p>№3. Решить систему уравнений методом Крамера, методом Гаусса:</p> $\begin{cases} x - 3y + z = -2, \\ x - 2y - 4z = -11, \\ -2x - y = 1 \end{cases}$
ВАРИАНТ 7	ВАРИАНТ 8
<p>№1. Вычислить определители 2-го порядка:</p> $\begin{vmatrix} 6 & 2 \\ -2 & 2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 4 & -6 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 9 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}$ <p>№2. Вычислить определитель 3-го порядка разложением по элементам какой-либо строки (столбца) и правилу треугольников:</p>	<p>№1. Вычислить определители 2-го порядка:</p> $\begin{vmatrix} 5 & -2 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 3 & 6 \\ -3 & 0 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 5 & -1 \\ 4 & 4 \end{vmatrix}$ <p>№2. Вычислить определитель 3-го порядка разложением по элементам какой-либо строки (столбца) и правилу треугольников:</p>

$\begin{vmatrix} 4 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \end{vmatrix}$ <p>№3. Решить систему уравнений методом Крамера, методом Гаусса:</p> $\begin{cases} 2x + y - z = 4, \\ x + 2y + z = 5, \\ 5x - y + 3z = 12 \end{cases}$	$\begin{vmatrix} 1 & -8 & 2 \\ -3 & -1 & 2 \\ 5 & 4 & 1 \end{vmatrix}$ <p>№3. Решить систему уравнений методом Крамера, методом Гаусса:</p> $\begin{cases} 3x + 2y + z = 3, \\ 5x - 2y - 2z = 3, \\ x + y - z = -2 \end{cases}$
ВАРИАНТ 9	ВАРИАНТ 10
<p>№1. Вычислить определители 2-го порядка:</p> $\begin{vmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 4 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} -2 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 1 & 10 \\ 2 & 7 \end{vmatrix}$ <p>№2. Вычислить определитель 3-го порядка разложением по элементам какой-либо строки (столбца) и правилу треугольников:</p> $\begin{vmatrix} 5 & 1 & -10 \\ 1 & 2 & 3 \\ -1 & 8 & 0 \end{vmatrix}$ <p>№3. Решить систему уравнений методом Крамера, методом Гаусса:</p> $\begin{cases} 3x + 4y + 2z = 5, \\ 5x - 6y - 4z = -3, \\ -4x + 5y + 3z = 1 \end{cases}$	<p>№1. Вычислить определители 2-го порядка:</p> $\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 12 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 9 & 2 \\ -2 & 3 \end{vmatrix}$ <p>№2. Вычислить определитель 3-го порядка разложением по элементам какой-либо строки (столбца) и правилу треугольников:</p> $\begin{vmatrix} -4 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 7 \end{vmatrix}$ <p>№3. Решить систему уравнений методом Крамера, методом Гаусса:</p> $\begin{cases} x - 2y + 3z = 3, \\ 3x + y - 6z = -7, \\ 9x - 2y - z = 3 \end{cases}$

Практическое занятие №3

Тема: Нахождение обратной матрицы. Решение систем линейных уравнений матричным методом

Цель работы: получить практические навыки вычисления определителей, действий с матрицами и решения систем линейных уравнений.

1. Краткие теоретические сведения:

Операции над матрицами.

1. Умножение матрицы на число.

Матрицу можно умножать на число, при этом каждый элемент матрицы умножают на это число.

2. Сложение матриц.

Складывать можно матрицы только одного размера, при этом матрицы складываются поэлементно, т.е. суммой матриц $A + B$ с элементами a_{ij} и b_{ij} соответственно является матрица C с элементами $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$.

3. Вычитание матриц.

Вычитание матриц производится аналогично сложению.

4. Умножение матриц.

Умножать можно только две *согласованные* матрицы, т.е. такие, что число столбцов первой матрицы равно числу строк второй матрицы.

Произведением матриц $A \cdot B$ называется такая матрица C , каждый элемент которой C_{ij} равен сумме произведений элементов i -ой строки матрицы A на соответствующие элементы j -го столбца матрицы B :

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{ik}b_{kj} = \sum_{s=1}^k a_{is}b_{sj} .$$
$$(i = 1 \div m, j = 1 \div m)$$

5. Возведение в степень.

Целой положительной степенью A^m квадратной матрицы A называется произведение m матриц, равных A , т.е.

$$A^m = A \cdot A \cdot A \dots A .$$

Из определения ясно, что операция возведения в степень определена только для квадратных матриц.

6. Транспонирование матрицы.

Транспонирование матрицы - это переход от матрицы A к матрице A^T , получаемой из исходной матрицы перемены местами строк и столбцов.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \dots a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} \dots a_{2n} \\ \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} \dots a_{mn} \end{pmatrix}, \quad A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} \dots a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} \dots a_{m2} \\ \dots & \dots \\ a_{1n} & a_{2n} \dots a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Обратная матрица.

Матрица A^{-1} называется **обратной по отношению к квадратной матрице A** , если при умножении этой матрицы на данную как справа, так и слева получается единичная матрица E , т.е.

$$A^{-1} \cdot A = A \cdot A^{-1} = E.$$

Правило нахождения обратной матрицы:

1. Находим определитель исходной матрицы. Если $\Delta A \neq 0$, то обратная матрица существует и единственная.
2. Находим обратную матрицу по формуле:

$$A^{-1} = \frac{1}{\Delta A} \cdot \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} \dots A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} \dots A_{n2} \\ \dots & \dots \\ A_{1n} & A_{2n} \dots A_{nn} \end{pmatrix},$$

где A_{ij} - алгебраические дополнения к элементам a_{ij} матрицы A .

3. Проверяем правильность нахождения обратной матрицы по формуле

$$A \cdot A^{-1} = 1.$$

Решение систем n линейных уравнений с n неизвестными матричным способом.

Пусть есть квадратная система линейных уравнений

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + a_{n3}x_3 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

Решением данной системы будет
будет матрица – столбец X , которую находят по формуле

$$X = A^{-1} \cdot B.$$

где $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \dots a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} \dots a_{2n} \\ \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} \dots a_{nn} \end{pmatrix}$ - матрица коэффициентов системы, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}$ - матрица-столбец переменных, $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix}$ - матрица-столбец свободных членов.

2. Методика решения типовых задач

2.1 Пример 1. Вычислить произведение матриц $A \cdot B$, если

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 5 & 1 & 4 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Решение. Матрицы A и B являются согласованными, т.к. матрица A имеет 3 столбца, а матрица B имеет 3 строки, поэтому умножение матриц возможно и в результате получим матрицу $A \cdot B = C$.

Вычислим элементы матрицы-произведения C следующим образом:

$$C = \begin{pmatrix} 1 \cdot (-1) + 0 \cdot 5 + 2 \cdot (-2) & 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 2 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 0 \cdot 4 + 2 \cdot 1 \\ 3 \cdot (-1) + 1 \cdot 5 + 0 \cdot (-2) & 3 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 & 3 \cdot 1 + 1 \cdot 4 + 0 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 7 \end{pmatrix}.$$

Пример 2. Даны матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Найти: $C = 2A + 3B^m$

Решение. Найдём

$$2A = 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 6 \\ 2 & 2 & 2 \\ 6 & 2 & 2 \end{pmatrix},$$

$$B^m = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$3B^m = 3 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 9 \\ 0 & 3 & 0 \\ -6 & -3 & 3 \end{pmatrix},$$

подставим в выражение для матрицы C найденные матрицы $2A$ и $3B^m$, окончательно получим:

$$C = 2A + 3B^m = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 6 \\ 2 & 2 & 2 \\ 6 & 2 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 6 & 9 \\ 0 & 3 & 0 \\ -6 & -3 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 8 & 15 \\ 2 & 5 & 2 \\ 0 & -1 & 5 \end{pmatrix}.$$

2.2 Пример 3. Найти матрицу, обратную к матрице $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Решение. Вычислим определитель матрицы A :

$$\Delta A = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - (-1) \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 - 1 + 4 - 1 + 2 - 1 = 5 \neq 0$$

Т.к. $\Delta A \neq 0$, то обратная матрица существует.

Найдём A_{ij} :

$$\begin{aligned} A_{11} &= (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 - 1 = 1 & A_{12} &= (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -(4 - 1) = -3 \\ A_{13} &= (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 - 1 = 1 & A_{21} &= (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -1(-2 - 1) = 3 \\ A_{22} &= (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 - 1 = 1 & A_{23} &= (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -(1 + 1) = -2 \\ A_{31} &= (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1 - 1 = -2 & A_{32} &= (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -(1 - 2) = 1 \\ A_{33} &= (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 + 2 = 3. \end{aligned}$$

Найдём обратную матрицу по формуле:

$$A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -3 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{3}{5} & -\frac{2}{5} \\ -\frac{3}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}.$$

2.3 Пример 4. Решить систему уравнений

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 3, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 11, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 8 \end{cases} \text{ матричным способом.}$$

Решение. Обозначим:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 \\ 11 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

Тогда в матричной форме данная система имеет вид:

$$A \cdot X = B.$$

Вычислим определитель матрицы A :

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 - 1 + 4 - 1 + 2 - 1 = 5 \neq 0$$

Т.к. $\det A \neq 0$, то матрица A - невырожденная и существует и единственна обратная матрица A^{-1} .

Обратную матрицу A^{-1} находим по формуле

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix}.$$

Вычислим A_{ij} :

$$\begin{aligned} A_{11} &= \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1, & A_{12} &= \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3, & A_{13} &= \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}, \\ A_{21} &= \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -3, & A_{22} &= \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1, & A_{23} &= \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2, \\ A_{31} &= \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -2, & A_{32} &= \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -1, & A_{33} &= \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 3. \end{aligned}$$

Получили

$$A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -3 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix},$$

тогда

$$X = A^{-1}B = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -3 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 11 \\ 8 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 \cdot 3 + 3 \cdot 11 - 2 \cdot 8 \\ -3 \cdot 3 + 1 \cdot 11 + 1 \cdot 8 \\ 1 \cdot 3 - 2 \cdot 11 + 3 \cdot 8 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 20 \\ 10 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ответ: (4;2;1).

3. Порядок выполнения практической работы

- 3.1 Изучить краткие теоретические сведения.
- 3.2 Решить задания своего варианта (Приложение)
- 3.3 Ответить на контрольные вопросы

4. Содержание отчёта

- 4.1 Тема и цель работы.
- 4.2 Решение заданий.
- 4.3 Ответы на контрольные вопросы.

5. Контрольные вопросы

- 5.1 Дайте определение матрицы.
- 5.2 Что называется элементами матрицы?
- 5.3 Как выполняют сложение (вычитание) матриц?
- 5.4 Как матрицу умножают на число?
- 5.5 Какие матрицы можно складывать и вычитать?
- 5.6 Какие матрицы можно умножать друг на друга?
- 5.7 Как осуществляется умножение матриц?
- 5.8 Какую матрицу можно возводить в целую положительную степень?
- 5.9 Что представляет собой матрица A^m ?
- 5.10 Как осуществляется операция транспонирования матриц?
- 5.11 Какая матрица называется обратной к данной матрице?
- 5.12 Какие матрицы могут иметь обратные матрицы?
- 5.13 Сформулируйте необходимое и достаточное условия существования обратной матрицы.
- 5.14 Сформулируйте правило нахождения обратной матрицы.
- 5.15 Какие элементарные преобразования можно выполнять с матрицами?
- 5.16 Запишите формулу решения системы линейных уравнений матричным способом.

6.Список справочной литературы

6.1 Алексеева Е.В. Основы линейной алгебры: учебное пособие для студентов 2-го курса технических специальностей по разделу дисциплины «Элементы высшей математики», «Математика».

6.2 Конспект теоретических занятий

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВАРИАНТ 1	ВАРИАНТ 2
<p>№1. Даны матрицы:</p> $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 3 & 0 & 1 \\ -2 & 3 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 3 \\ -4 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & -5 \end{pmatrix}$ <p>Найти: $3A^m - 2B + B^{-1}$</p> <p>№2. Решить систему матричным методом:</p> $\begin{cases} 3x + 4y + 2z = 5, \\ 5x - 6y - 4z = -3, \\ -4x + 5y + 3z = 1 \end{cases}$	<p>№1. Даны матрицы</p> $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 3 & 0 & 1 \\ -2 & 3 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 3 \\ -4 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & -5 \end{pmatrix}$ <p>Найти: $2B^m + 3A - A^{-1}$</p> <p>№2. Решить систему матричным методом:</p> $\begin{cases} x - 2y + 3z = 3, \\ 3x + y - 6z = -7, \\ 9x - 2y - z = 3 \end{cases}$
ВАРИАНТ 3	ВАРИАНТ 4
<p>№1. Даны матрицы</p> $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 3 & 0 & 1 \\ -2 & 3 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 3 \\ -4 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & -5 \end{pmatrix}$ <p>Найти: $5A^m - 3B + B^{-1}$</p> <p>№2. Решить систему матричным методом:</p> $\begin{cases} 2x + y - z = 4, \\ x + 2y + z = 5, \\ 5x - y + 3z = 12 \end{cases}$	<p>№1. Даны матрицы:</p> $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 3 & 0 & 1 \\ -2 & 3 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 3 \\ -4 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & -5 \end{pmatrix}$ <p>Найти: $-2B^m + 4A - A^{-1}$</p> <p>№2. Решить систему матричным методом:</p> $\begin{cases} 3x + 2y + z = 3, \\ 5x - 2y - 2z = 3, \\ x + y - z = -2 \end{cases}$

Практическое занятие №4

Тема: Действия над комплексными числами в алгебраической, тригонометрической и показательной формах.

Цель работы: получить практические навыки выполнения действий с комплексными числами в различных формах записи, нахождения модуля и аргумента комплексного числа, решения квадратных уравнений с отрицательным дискриминантом.

1. Краткие теоретические сведения

Комплексным числом z называется выражение вида

$$z = x + iy,$$

где x, y - действительные числа, i - мнимая единица

$$i^2 = -1.$$

x - **действительная часть** комплексного числа ($\operatorname{Re} z$),

y - **мнимая часть** комплексного числа. ($\operatorname{Im} z$)

Два комплексных числа $z_1 = x_1 + iy_1$ и $z_2 = x_2 + iy_2$ называются **равными**, если равны их действительные и мнимые части:

$$x_1 = x_2, \quad y_1 = y_2$$

Два комплексных числа $z = x + iy$ и $\bar{z} = x - iy$, отличающиеся лишь знаком мнимой части, называются **сопряженными**.

Запись комплексного числа

$$z = x + iy,$$

называется **алгебраической формой записи** комплексного числа z .

Действия с комплексными числами в алгебраической форме записи.

1. Сложение

Суммой двух комплексных чисел $z_1 = x_1 + iy_1$ и $z_2 = x_2 + iy_2$ называется комплексное число, определяемое равенством:

$$z = z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$$

2. Вычитание

Разностью двух комплексных чисел $z_1 = x_1 + iy_1$ и $z_2 = x_2 + iy_2$ называется комплексное число:

$$z = z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2)$$

3. Умножение

Произведением комплексных чисел $z_1 = x_1 + iy_1$ и $z_2 = x_2 + iy_2$ называется комплексное число:

$$z = z_1 \cdot z_2 = (x_1x_2 - y_1y_2) + (x_1y_2 + x_2y_1)$$

На практике, чтобы выполнить умножение комплексных чисел

$$z_1 \cdot z_2 = (x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2)$$

нужно раскрыть скобки, заменить $i^2 = -1$, а затем привести подобные слагаемые.

4. Деление

Частное двух комплексных чисел z_1 и $z_2 \neq 0$ находят по следующему **правилу**:

числитель и знаменатель дроби $\frac{z_1}{z_2}$ умножают на число \bar{z}_2 , сопряженное зна-

менателю, раскрывают скобки, заменяют $i^2 = -1$, приводят подобные слагаемые и почленно делят числитель на знаменатель.

Возведение в степень комплексного числа и извлечение корня n -ой степени из комплексного числа в алгебраической форме не выполняют.

Геометрическое изображение комплексного числа.

Комплексное число $z = x + iy$, изображают на координатной плоскости в виде радиус-вектора, конец которого имеет координаты $(x; y)$

Длина радиус-вектора называется **модулем комплексного числа**, обозначается r и вычисляется по формуле:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Угол, который радиус-вектор, изображающий комплексное число, образует

с положительным направлением оси OX , называется **аргументом комплексного числа** и обозначается φ .

Аргумент комплексного числа удобно определять с помощью следующей таблицы:

Четверть, в которой находится радиус-вектор, изображающий комплексное число	Формула для определения аргумента
I	$\varphi = \varphi_0$
II, III	$\varphi = \varphi_0 + \pi$
IV	$\varphi = \varphi_0 + 2\pi$

где φ_0 определяют по формуле:

$$\varphi_0 = \operatorname{arctg} \frac{y}{x}.$$

Тригонометрическая форма записи комплексного числа:

$$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

Показательная форма записи комплексного числа:

$$z = r \cdot e^{i\varphi}$$

Действия с комплексными числами в тригонометрической и показательной формах записи:

Действие	Тригонометрическая форма записи $z_1 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$ $z_2 = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$	Показательная форма записи $z_1 = r_1 \cdot e^{i\varphi_1}$ $z_2 = r_2 \cdot e^{i\varphi_2}$
Умножение	$z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \cdot \sin(\varphi_1 + \varphi_2))$	$z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$
Деление		

	$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2))$	$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)}$
Возведение в целую степень	$z^n = r^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$	$z^n = r^n e^{in\varphi}$
Извлечение корня n-ой степени	$z_k = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2\pi k}{n} \right),$ $k = 0 \div (n - 1)$	$z_k = \sqrt[n]{r} e^{i \frac{\varphi + 2\pi k}{n}},$ $k = 0 \div (n - 1)$

2. Методика решения типовых задач

2.1 Пример 1. Выполнить действия в алгебраической форме

$$\frac{(7 - 5i)(6 + 7i)}{(1 - 3i) + (3 - i)}$$

Решение. В числителе дроби раскроем скобки, а в знаменателе выполним сложение комплексных чисел, сложив соответственно действительные и мнимые части:

$$\frac{(7 - 5i)(6 + 7i)}{(1 - 3i) + (3 - i)} = \frac{42 + 49i - 30i - 35i^2}{4 - 4i} = \frac{42 + 35 + 19i}{4 - 4i} = \frac{77 + 19i}{4 - 4i}$$

Умножим теперь числитель и знаменатель дроби на выражение $4 + 4i$, сопряжённое знаменателю:

$$\frac{(77 + 19i) \cdot (4 + 4i)}{(4 - 4i) \cdot (4 + 4i)} = \frac{308 + 308i + 76i + 76i^2}{16 - 16i^2} = \frac{234 + 384i}{32} = \frac{117}{16} + 12i$$

2.2 Пример 2. Даны числа $z_1 = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$, $z_2 = -\frac{1}{3} - \frac{1}{3}i$. Выполнить в тригонометрической форме записи $z_1 \cdot z_2$, $\sqrt[3]{z_1}$, в показательной форме $\frac{z_1}{z_2}$, z_2^4 .

Решение. Найдём модули и аргументы чисел z_1 и z_2 :

$$r_1 = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = 1.$$

$$r_2 = \sqrt{\left(-\frac{1}{3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{3}.$$

Радиус-вектор, изображающий число z_1 находится в IV четверти, поэтому аргумент числа z_1 находим по формуле

$$\varphi_1 = \varphi_0 + 2\pi = \operatorname{arctg} \frac{-\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}} + 2\pi = -\operatorname{arctg} \sqrt{3} + 2\pi = -\frac{\pi}{3} + 2\pi = \frac{5\pi}{3}$$

Радиус-вектор, изображающий число z_2 находится в III четверти, поэтому аргумент числа z_2 находим по формуле

$$\varphi_2 = \varphi_0 + 2\pi = \operatorname{arctg} \frac{-\frac{1}{3}}{-\frac{1}{3}} + \pi = \operatorname{arctg} 1 + \pi = \frac{\pi}{4} + \pi = \frac{5\pi}{4}$$

Запишем числа z_1 и z_2 в тригонометрической и показательной формах:

$$z_1 = \cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3}, \quad z_2 = \frac{\sqrt{2}}{3} \left(\cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4} \right)$$

$$z_1 = e^{\frac{5\pi i}{3}}, \quad z_2 = \frac{\sqrt{2}}{3} e^{\frac{5\pi i}{4}}.$$

Найдём $z_1 \cdot z_2$ (см. таблицу):

$$z_1 z_2 = \frac{\sqrt{2}}{3} \left(\cos \left(\frac{5\pi}{3} + \frac{5\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{5\pi}{3} + \frac{5\pi}{4} \right) \right) = \frac{\sqrt{2}}{3} \left(\cos \frac{35\pi}{12} + i \sin \frac{35\pi}{12} \right) =$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{3} \left(\cos \frac{11\pi}{12} + i \sin \frac{11\pi}{12} \right)$$

Найдём $\sqrt[3]{z_1}$ (см. таблицу):

$$k = 0, \quad z_{1,0} = \cos \frac{5\pi}{9} + i \sin \frac{5\pi}{9}$$

$$k = 1, \quad z_{1,1} = \cos \frac{\frac{5\pi}{3} + 2\pi}{3} + i \sin \frac{\frac{5\pi}{3} + 2\pi}{3} = \cos \frac{11\pi}{9} + i \sin \frac{11\pi}{9}$$

$$k = 2, \quad z_{1,2} = \cos \frac{\frac{5\pi}{3} + 4\pi}{3} + i \sin \frac{\frac{5\pi}{3} + 4\pi}{3} = \cos \frac{17\pi}{9} + i \sin \frac{17\pi}{9}$$

Найдём $\frac{z_1}{z_2}$ (см. таблицу):

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{1}{\frac{\sqrt{2}}{3}} e^{i\left(\frac{5\pi}{3} - \frac{5\pi}{4}\right)} = \frac{3\sqrt{2}}{2} e^{\frac{5\pi}{12}i}$$

Найдём z_2^4 (см. таблицу):

$$z_2^4 = \left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right)^4 e^{4 \cdot \frac{5\pi}{4}i} = \frac{4}{81} e^{5\pi \cdot i} = \frac{4}{81} e^{\pi i}$$

2.3 Пример 3. Решить уравнение с отрицательным дискриминантом $x^2 + 4x + 13 = 0$.

Решение. Вычислим дискриминант квадратного уравнения:

$$D = b^2 - 4ac = 4^2 - 4 \cdot 13 = -36.$$

Представим

$$-36 = -1 \cdot 36 = 36 \cdot i^2$$

Воспользуемся формулой корней квадратного уравнения, получим

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{-4 \pm \sqrt{36i^2}}{2} = \frac{-4 \pm 6i}{2} = -2 \pm 3i.$$

Таким образом, корнями квадратного уравнения с отрицательным дискриминантом являются два комплексно сопряжённых числа. В данном случае

$$z_1 = -2 + 3i, \quad z_2 = -2 - 3i$$

3. Порядок выполнения практической работы

3.1 Изучить краткие теоретические сведения.

3.2 Решить задания своего варианта (Приложение)

3.3 Ответить на контрольные вопросы

4. Содержание отчёта

4.1 Тема и цель работы.

4.2 Решение заданий.

4.3 Ответы на контрольные вопросы.

5. Контрольные вопросы

- 5.1 Дайте определение комплексного числа.
5.2 Что называется мнимой единицей?
5.3 Как записывают комплексное число в алгебраической форме?
5.4 Как выполняют сложение, вычитание, умножение и деление комплексных чисел в алгебраической форме записи?
5.5 Как геометрически изображают комплексное число?
5.6 Что называется модулем и аргументом комплексного числа? Запишите формулу вычисления модуля и аргумента.
5.7 Как записывают комплексное число в тригонометрической форме, в показательной форме?
5.8 Как выполняют умножение, деление, возведение в степень и извлечение корня целой степени в тригонометрической и показательной формах записи (запишите формулы)?

6. Список справочной литературы

- 6.1 Дадаян А.А. Математика: Учебник для СПО.- М.: Инфра-М, 2021.- 544с.
6.2 Дадаян А.А. Сборник задач по математике: Учебное пособие для СПО / А.А. Дадаян.- М.: Форум, 2018.- 352с.
6.3 Конспект теоретических занятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВАРИАНТ №1	ВАРИАНТ №2
<p>№1. Выполнить действия в алгебраической форме:</p> $\frac{(2+i) \cdot (3-i)}{(2+3i) - (3+2i)}$	<p>№1. Выполнить действия в алгебраической форме:</p> $\frac{(4+i) \cdot (5+3i)}{(3+i) + (2+i)}$
<p>№2. Даны числа $z_1 = -\frac{1}{7} + \frac{\sqrt{3}}{7}i$ и</p> $z_2 = -\frac{3}{5} + \frac{\sqrt{3}}{5} \cdot i.$	<p>№2. Даны числа $z_1 = -\frac{1}{8} + \frac{\sqrt{3}}{8}i$ и</p> $z_2 = -1 - \sqrt{3} \cdot i.$

<p>a) Записать числа z_1 и z_2 в тригонометрической и показательной формах, геометрически изобразить эти числа.</p> <p>b) Найти $z_1 \cdot z_2$ и $\frac{z_1}{z_2}$ в тригонометрической форме.</p> <p>c) Найти $\sqrt[3]{z_1}$ в показательной форме.</p> <p>№3. Решить уравнение: $x^2 - 2x + 5 = 0$</p>	<p>a) Записать числа z_1 и z_2 в тригонометрической и показательной формах, геометрически изобразить эти числа.</p> <p>b) Выполнить действия в тригонометрической форме $\frac{z_1}{z_2}$, z_1^3.</p> <p>c) Выполнить действия в показательной форме $z_1 \cdot z_2$, $\sqrt[3]{z_2}$.</p> <p>№3. Решить уравнение: $x^2 - 8x + 25 = 0$</p>
ВАРИАНТ №3	ВАРИАНТ №4
<p>№1. Выполнить действия в алгебраической форме: $\frac{(3 - i) \cdot (1 - 4i)}{(2 - i) + (-2 + 2i)}$</p> <p>№2. Даны числа $z_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i$ и $z_2 = -4 - 4\sqrt{3} \cdot i$.</p>	<p>№1. Выполнить действия в алгебраической форме: $\frac{(5 - 7i) \cdot (7 + 6i)}{(4 - 5i) - (3 - 4i)}$</p> <p>№2. Даны числа $z_1 = -\frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{3}i$ и $z_2 = -\frac{3}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot i$.</p>

<p>a) Записать числа z_1 и z_2 в тригонометрической и показательной формах, геометрически изобразить эти числа.</p> <p>b) Выполнить действия в тригонометрической форме $z_1 \cdot z_2$, $\sqrt[3]{z_1}$.</p> <p>c) Выполнить действия в показательной форме $\frac{z_2}{z_1}$, z_2^3.</p> <p>№3. Решить уравнение: $x^2 + 6x + 18 = 0$</p>	<p>a) Записать числа z_1 и z_2 в тригонометрической и показательной формах, геометрически изобразить эти числа.</p> <p>b) Выполнить действия в тригонометрической форме z_2^5, $\sqrt[4]{z_1}$.</p> <p>c) Выполнить действия в показательной форме $\frac{z_1}{z_2}$, $z_1 \cdot z_2$.</p> <p>№3. Решить уравнение: $x^2 + 8x + 17 = 0$</p>
--	--

Практическое занятие №5

Тема: Векторное и смешанное произведение векторов, его практическое применение.

Цель работы: получить практические навыки использования векторного и смешанного произведения векторов при решении практических задач.

1. Краткие теоретические сведения

Скалярным произведением двух ненулевых векторов \vec{a} и \vec{b} называется число, равное произведению длин этих векторов на косинус угла между ними. Обозначается: $\vec{a} \cdot \vec{b}$. Таким образом,

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi$$

Если векторы \vec{a} и \vec{b} заданы своими координатами $\vec{a} = (x_1; y_1; z_1)$ и $\vec{b} = (x_2; y_2; z_2)$, то скалярное произведение можно вычислить по формуле:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2$$

Длина вектора $\vec{a} = (x_1; y_1; z_1)$ вычисляется по формуле:

$$|\vec{a}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}$$

или по формуле:

$$|\vec{a}| = |\vec{AB}| = \sqrt{(x_k - x_n)^2 + (y_k - y_n)^2 + (z_k - z_n)^2},$$

где даны координаты точек $A = (x_n; y_n; z_n)$ - начало вектора и $B = (x_k; y_k; z_k)$ - конец вектора.

Угол между векторами $\vec{a} = (x_1; y_1; z_1)$ и $\vec{b} = (x_2; y_2; z_2)$ вычисляется по формуле:

$$\cos \varphi = \frac{x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}.$$

Три некопланарных вектора \vec{a} , \vec{b} и \vec{c} , взятые в указанном порядке, образуют **правую(левую) тройку**, если с конца вектора \vec{c} кратчайший поворот от первого вектора \vec{a} ко второму вектору \vec{b} виден совершающимся против часовой стрелки, (соответственно, по часовой стрелке).

Векторным произведением неколлинеарных векторов \vec{a} и \vec{b} называется вектор \vec{c} , определяемый условиями:

- 1) длина вектора \vec{c} равна площади параллелограмма, построенного на векторах \vec{a} и \vec{b} как на сторонах, т.е. $|\vec{c}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \varphi$;
- 2) вектор \vec{c} перпендикулярен векторам \vec{a} и \vec{b} , т.е. $\vec{c} \perp \vec{a}$ и $\vec{c} \perp \vec{b}$;
- 3) векторы \vec{a} , \vec{b} и \vec{c} образуют правую тройку.

Векторное произведение обозначается $\vec{a} \times \vec{b}$ или $[\vec{a}, \vec{b}]$

Если векторы **коллинеарные**, то $\vec{a} \times \vec{b} = 0$

Если векторы \vec{a} и \vec{b} заданы своими координатами $\vec{a} = (x_1; y_1; z_1)$ и $\vec{b} = (x_2; y_2; z_2)$, то векторное произведение можно вычислить по формуле:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} \quad \text{или} \quad \vec{a} \times \vec{b} = \left(\begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix}; - \begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} \right)$$

Для вычисления **площади параллелограмма**, построенного на векторах \vec{a} и \vec{b} применяется формула: $S = |\vec{a} \times \vec{b}|$

Смешанным произведением трех векторов \vec{a} , \vec{b} и \vec{c} называется число, равное скалярному произведению векторов $\vec{a} \times \vec{b}$ на вектор \vec{c} .

Обозначается смешанное произведение: $\vec{a}\vec{b}\vec{c}$. Таким образом: $\vec{a}\vec{b}\vec{c} = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$

Геометрически смешанное произведение интерпретируется как число, равное объему параллелепипеда, построенного на векторах \vec{a} , \vec{b} и \vec{c} , как на ребрах. Смешанное произведение положительно, если данные векторы образуют правую тройку, и отрицательно – если левую.

Если векторы \vec{a} , \vec{b} и \vec{c} **компланарные**, то $\vec{a}\vec{b}\vec{c} = 0$

Если векторы \vec{a} , \vec{b} и \vec{c} заданы своими координатами $\vec{a} = (x_1; y_1; z_1)$ и $\vec{b} = (x_2; y_2; z_2)$, $\vec{c} = (x_3; y_3; z_3)$ то смешанное произведение можно вычислить по формуле:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}. \text{ Если } \vec{a}\vec{b}\vec{c} > 0, \text{ то } \vec{a}, \vec{b} \text{ и } \vec{c} - \text{ правая тройка, если } \vec{a}\vec{b}\vec{c} < 0, \text{ то } \vec{a}, \vec{b} \text{ и } \vec{c} - \text{ левая тройка.}$$

Объем параллелепипеда, построенного на векторах \vec{a} , \vec{b} и \vec{c} вычисляется по формуле:

$$V = |\vec{a}\vec{b}\vec{c}| = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$$

Объем треугольной пирамиды (тетраэдра), построенной на векторах \vec{a} , \vec{b}

и \bar{c} вычисляется по формуле:

$$V = \frac{1}{6} |\bar{a}\bar{b}\bar{c}| = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$$

2. Методика решения типовых задач

2.1 Пример 1. Даны вершины треугольника $A = (2; 3; -1)$, $B = (4; 1; -2)$ и $C = (1; 0; 2)$

Найти внутренний угол при вершине C .

Решение.

Угол φ при вершине C есть угол между векторами \bar{CB} и \bar{CA} . Определим координаты этих векторов:

$$\bar{CB} = (4 - 1; 1 - 0; -2 - 2) = (3; 1; -4),$$

$$\bar{CA} = (2 - 1; 3 - 0; -1 - 2) = (1; 3; -3).$$

Найдем их длины (модули):

$$|\bar{CB}| = \sqrt{9 + 1 + 16} = \sqrt{26}, \quad |\bar{CA}| = \sqrt{1 + 9 + 9} = \sqrt{19}.$$

Согласно формуле вычисления угла между векторами, получим:

$$\cos \varphi = \frac{\bar{CB} \cdot \bar{CA}}{|\bar{CB}| \cdot |\bar{CA}|} = \frac{3 \cdot 1 + 1 \cdot 3 + (-4)(-3)}{\sqrt{26} \cdot \sqrt{19}} = \frac{18}{\sqrt{494}}.$$

Следовательно, получим:

$$\varphi = \arccos \frac{18}{\sqrt{494}}.$$

2.2 Пример 2. Найти площадь треугольника с вершинами $A = (1; 2; 0)$, $B = (3; 2; 1)$ и $C = (-2; 1; 2)$.

Решение.

Площадь треугольника ABC равна половине площади параллелограмма, построенного на векторах \bar{AB} и \bar{AC} , т.е. $S = \frac{1}{2} |\bar{AB} \times \bar{AC}|$. Имеем: $\bar{AB} = (2; 0; 1)$, $\bar{AC} = (-3; -1; 2)$. Тогда по формуле вычисления векторного произведения, получим:

$$\bar{AB} \times \bar{AC} = \left(\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}; - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 2 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ -3 & -1 \end{vmatrix} \right),$$

т.е. $\bar{AB} \times \bar{AC} = (1; -7; -2)$. Следовательно, $S = \frac{1}{2} \sqrt{1 + 49 + 4}$, $S = \frac{3\sqrt{6}}{2}$.

2.3 Пример 3. Даны вершины пирамиды (тетраэдра) $A = (5; 1; -4)$, $B = (1; 2; -1)$,

$$C = (3;3;-4), D = (2;2;2)$$

Решение.

Найдем координаты векторов:

$$\vec{AB} = (-4;1;3)$$

$$\vec{AC} = (-2;2;0)$$

$$\vec{AD} = (-3;1;6).$$

И, согласно формуле объема треугольной пирамиды и формуле вычисления смешанного произведения векторов, получим:

$$V = \frac{1}{6} |\vec{AB} \cdot \vec{AC} \cdot \vec{AD}| = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} -3 & 1 & 6 \\ -4 & 1 & 3 \\ -2 & 2 & 0 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} |18 - 6 - 36| = \frac{1}{6} |-24| = 4$$

3. Порядок выполнения практической работы

- 3.1 Изучить краткие теоретические сведения.
- 3.2 Решить задания своего варианта (Приложение)
- 3.3 Ответить на контрольные вопросы

4. Содержание отчёта

- 4.1 Тема и цель работы.
- 4.2 Решение заданий.
- 4.3 Ответы на контрольные вопросы.

5. Контрольные вопросы

- 5.1 Дайте определение скалярного произведения векторов.
- 5.2 Запишите формулу скалярного произведения векторов.
- 5.3 Дайте определение векторного произведения векторов.
- 5.4 Запишите формулу векторного произведения векторов.
- 5.5 Дайте определение смешанного произведения векторов.
- 5.6 Запишите формулу смешанного произведения векторов.

6. Список справочной литературы

- 6.1 Дадаян А.А. Математика: Учебник для СПО.- М.: Инфра-М, 2019.- 544с.
- 6.3 Конспект теоретических занятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВАРИАНТ №1	ВАРИАНТ №2
<p>№1 Даны вершины пирамиды $A = (7; 2; 4)$, $B = (7; -1; -2)$, $C = (3; 3; 1)$, $D = (-4; 2; 1)$. Найти:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Угол между ребрами \vec{AB} и \vec{AD} 2) Длину ребра \vec{AC} 3) Площадь грани ABC 4) Объем пирамиды. <p>№2 Проверить лежат ли точки $A = (3; -1; 2)$, $B = (1; 2; -1)$, $C = (-1; 1; -3)$, $D = (3; -5; 3)$ в одной плоскости.</p>	<p>№1. Даны вершины пирамиды $A = (-2; 0; -4)$, $B = (-1; 7; 1)$, $C = (4; -8; -4)$, $D = (1; -4; 6)$. Найти:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Косинус угла между ребрами \vec{AB} и \vec{AD} 2) Длину ребра \vec{AC} 3) Площадь грани ABC 4) Объем пирамиды. <p>№2. Показать, что векторы \vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD} компланарны, если $A = (5; 7; -2)$, $B = (3; 1; -1)$, $C = (9; 4; -4)$, $D = (1; 5; 0)$.</p>
ВАРИАНТ №3	ВАРИАНТ №4
<p>№1 Даны вершины пирамиды $A = (1; 3; 6)$, $B = (2; 2; 1)$, $C = (-1; 0; 1)$, $D = (-4; 6; -3)$. Найти:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Угол между ребрами \vec{AB} и \vec{AD} 2) Длину ребра \vec{AC} 3) Площадь грани ABC 4) Объем пирамиды. <p>№2. Доказать, точки $A = (3; 5; 1)$, $B = (2; 4; 7)$, $C = (1; 5; 3)$, $D = (4; 4; 5)$ лежат в одной плоскости.</p>	<p>№1. Даны вершины пирамиды $A = (1; 2; 0)$, $B = (3; 0; -3)$, $C = (5; 2; 6)$, $D = (8; 4; -9)$. Найти:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Косинус угла между ребрами \vec{AB} и \vec{AD} 2) Длину ребра \vec{AC} 3) Площадь грани ABC 4) Объем пирамиды. <p>№2. Проверить компланарны ли векторы \vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}, если $A = (2; 5; 3)$, $B = (3; 7; 4)$, $C = (-5; -5; -1)$, $D = (-4; -3; 0)$</p>

Практическое занятие №6

Тема: Нахождение различных видов уравнений прямой.

Цель работы: получить практические навыки составления различных видов уравнений прямой линии на плоскости, вычисления угла между двумя прямыми, нахождения расстояния от точки до прямой, нахождения точки пересечения двух прямых.

1. Краткие теоретические сведения.

Уравнение прямой, проходящей через две точки, перпендикулярно заданному вектору:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$$

где $(x_0; y_0)$ - координаты заданной точки, $(A; B)$ - координаты заданного вектора.

Общее уравнение прямой:

$$Ax + By + C = 0,$$

где $(A; B)$ - координаты вектора, перпендикулярного данной прямой.

Уравнение прямой, проходящей через заданную точку параллельно заданному вектору:

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n},$$

где $(x_0; y_0)$ - координаты заданной точки, $(m; n)$ - координаты заданного вектора.

Уравнение прямой, проходящей через две заданные точки:

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1},$$

где $(x_1; y_1)$ и $(x_2; y_2)$ - координаты заданных точек.

Уравнение прямой в отрезках:

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1,$$

где a, b - отрезки отсекаемые данной прямой на осях OX и OY соответственно.

Уравнение прямой с угловым коэффициентом:

$$y = kx + b,$$

где k - угловой коэффициент прямой (тангенс угла наклона прямой к оси OX), b - начальная ордината.

Формула расстояния (d) от точки с координатами $(x_0; y_0)$ до прямой $Ax + By + C = 0$:

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Формулы вычисления угла между двумя прямыми:

1. Если прямые заданы общими уравнениями

$$A_1x + B_1y + C_1 = 0 \text{ и } A_2x + B_2y + C_2 = 0,$$

то угол между прямыми вычисляют по формуле

$$\cos \alpha = \frac{A_1A_2 + B_1B_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2}}.$$

2. Если прямые заданы уравнениями с угловым коэффициентом

$$y = k_1x + b_1 \text{ и } y = k_2x + b_2,$$

то угол между прямыми вычисляют по формуле

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{|k_2 - k_1|}{1 - k_1 \cdot k_2}$$

Координаты точки пересечения двух прямых:

Чтобы найти координаты точки пересечения двух прямых, заданных уравнениями

$$A_1x + B_1y + C_1 = 0 \text{ и } A_2x + B_2y + C_2 = 0,$$

нужно решить систему уравнений

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2 = 0 \end{cases}$$

Решение данной системы и будет являться координатами точки пересечения данных прямых.

2. Методика решения типовых задач

2.1 Дан треугольник ABC с координатами вершин $A(4;1)$, $B(0;3)$, $C(-1;-2)$.

Сделать чертёж и найти:

1. Уравнение стороны AB (окончательный результат записать в виде уравнения прямой с угловым коэффициентом).
2. Уравнение медианы BM (результат записать в виде общего уравнения прямой).
3. Уравнение высоты AK (результат записать в виде общего уравнения прямой).

4. Длину высоты AK .
5. Угол между прямыми AK и BM .
6. Координаты точки пересечения прямых AK и BM .

Решение.

- а. Уравнение стороны AB запишем как уравнение прямой, проходящей через две заданные точки

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1},$$

где за x_1, y_1 возьмём координаты точки A , за x_2, y_2 - координаты точки B , подставив в уравнение соответствующие числа, получим

$$\frac{x - 4}{0 - 4} = \frac{y - 1}{3 - 1}, \quad \frac{x - 4}{-4} = \frac{y - 1}{2},$$

перепишем теперь полученное уравнение в виде уравнения с угловым коэффициентом:

$$2(x - 4) = -4(y - 1) \Rightarrow 4y = -2x + 12 \Rightarrow y = -\frac{1}{2}x + 3.$$

Окончательно получим уравнение стороны AB

$$x + 2y - 6 = 0.$$

- б. Уравнение медианы BM , также как и в первом случае будем искать в виде уравнения прямой, проходящей через две заданные точки. Для этого найдём координаты точки M как середину отрезка AC :

$$x_M = \frac{x_A + x_C}{2} = \frac{4 - 1}{2} = \frac{3}{2}, \quad y_M = \frac{y_A + y_C}{2} = \frac{1 - 2}{2} = -\frac{1}{2}.$$

Подставим в уравнение координаты точек B и M , получим

$$\frac{x - \frac{3}{2}}{0 - \frac{3}{2}} = \frac{y + \frac{1}{2}}{3 + \frac{1}{2}} \Rightarrow \frac{2x - 3}{3} = \frac{2y + 1}{7},$$

перепишем полученное уравнение в виде общего уравнения прямой:

$$7(2x - 3) = 3(2y + 1) \Rightarrow 14x - 21 = 6y + 3 \Rightarrow 14x - 6y - 24 = 0$$

окончательно получим:

$$7x - 3y - 12 = 0.$$

- в. Уравнение высоты AK будем искать в виде уравнения прямой, проходящей через точку A перпендикулярно вектору BC :

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0,$$

где $x_0 = 4, y_0 = 1$ - координаты точки A , $(A; B) = (-1 - 0; -2 - 3) = (-1; -5)$ - координаты вектора BC

Подставим соответствующие координаты в уравнение, получим:

$$-(x - 4) - 5(y - 1) = 0 \Rightarrow x + 5y - 9 = 0.$$

- d. Длину высоты AK найдём как расстояние от точки A до прямой BC , по формуле:

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}},$$

где $x_0 = 4, y_0 = 1$ - координаты точки A ; A, B, C - первый, второй и третий коэффициенты из уравнения прямой BC .

Найдём уравнение прямой BC , как уравнение прямой, проходящей через две заданные точки:

$$\frac{x - 0}{-1 - 0} = \frac{y - 3}{-2 - 3} \Rightarrow \frac{x}{-1} = \frac{y - 3}{-5} \Rightarrow 5x - y + 3 = 0 \Rightarrow A = 5, \quad B = -1$$

Подставим все известные значения в формулу для нахождения расстояния от точки до прямой:

$$d = \frac{|5 \cdot 4 - 1 + 3|}{\sqrt{5^2 + (-1)^2}} = \frac{22}{\sqrt{26}} = \frac{11\sqrt{26}}{13}.$$

- e. Угол между прямыми AK и BM найдём по формуле

$$\cos \alpha = \frac{A_1 A_2 + B_1 B_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2}}.$$

Подставив соответствующие значения коэффициентов, получим

$$\cos \alpha = \frac{1 \cdot 7 + 5 \cdot (-3)}{\sqrt{1 + 25} \cdot \sqrt{49 + 9}} = -\frac{8}{\sqrt{1508}}.$$

$$\alpha = \arccos\left(-\frac{8}{\sqrt{1508}}\right) = \pi - \arccos \frac{8}{\sqrt{1508}}$$

- f. Для нахождения координат точки пересечения прямых AK и BM решим систему

$$\begin{cases} 7x - 3y - 12 = 0, \\ x + 5y - 9 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 7x - 3y = 12, \\ x + 5y = 9 \end{cases} \cdot (-7) \Rightarrow \begin{cases} 7x - 3y = 12, \\ -7x - 35y = -63 \end{cases} \Rightarrow \\ \Rightarrow -38y = -51 \Rightarrow y = \frac{51}{38} = 1 \frac{13}{38}$$

Подставив найденное значение y в любое из уравнений системы, найдём

$$x = \frac{87}{38} = 2 \frac{11}{38}.$$

Таким образом, точка пересечения прямых AK и BM имеет координаты $\left(2 \frac{11}{38}; 1 \frac{13}{38}\right)$.

3. Порядок выполнения практической работы

- 3.1 Изучить краткие теоретические сведения.
- 3.2 Решить задания своего варианта (Приложение)
- 3.3 Ответить на контрольные вопросы

4. Содержание отчёта

- 4.1 Тема и цель работы.
- 4.2 Решение заданий.
- 4.3 Ответы на контрольные вопросы.

5. Контрольные вопросы

- 5.1 Запишите уравнение прямой, проходящей через заданную точку, перпендикулярно заданному вектору.
- 5.2 Запишите уравнение прямой, проходящей через заданную точку, параллельно заданному вектору.
- 5.3 Запишите уравнение прямой, проходящей через две заданные точки.
- 5.4 Запишите общее уравнение прямой.
- 5.5 Запишите уравнение прямой с угловым коэффициентом.
- 5.6 Запишите формулу расстояния от точки до прямой.
- 5.7 Запишите формулы вычисления угла между векторами.
- 5.8 Как найти точку пересечения двух прямых?

6. Список справочной литературы

- 6.1 Дадаян А.А. Математика: Учебник для СПО.- М.: Инфра-М, 2019.- 544с.
- 6.3 Конспект теоретических занятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Даны вершины треугольника $A(x; y)$, $B(x; y)$, $C(x; y)$. Сделать чертёж и

найти:

1. Уравнение стороны AB (окончательный результат записать в виде уравнения прямой с угловым коэффициентом).
2. Уравнение медианы BM (результат записать в виде общего уравнения прямой).
3. Уравнение высоты AK (результат записать в виде общего уравнения прямой).
4. Длину высоты AK .

5. Угол между прямыми AK и BM .

6. Координаты точки пересечения прямых AK и BM .

ВАРИАНТ 1	ВАРИАНТ 2
$A(1;1), B(7;4), C(4;5)$	$A(1;1), B(-5;4), C(-2;5)$
ВАРИАНТ 3	ВАРИАНТ 4
$A(-1;1), B(5;4), C(2;5)$	$A(-1;1), B(-7;4), C(-4;5)$
ВАРИАНТ 5	ВАРИАНТ 6
$A(1;-1), B(7;2), C(4;5)$	$A(1;-1), B(-5;2), C(-2;3)$
ВАРИАНТ 7	ВАРИАНТ 8
$A(-1;-1), B(5;2), C(2;3)$	$A(-1;-1), B(-7;2), C(-4;3)$
ВАРИАНТ 9	ВАРИАНТ 10
$A(0;1), B(6;4), C(3;5)$	$A(1;0), B(7;3), C(4;4)$

Практическое занятие №7

Тема: Решение задач по теме «Кривые второго порядка».


Цель работы: получить практические навыки в составлении уравнений линий второго порядка.

1. Краткие теоретические сведения

Каноническое уравнение окружности:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2,$$

где $(a; b)$ - координаты центра окружности, R - радиус окружности.



Каноническое уравнение эллипса, фокусы которого лежат на оси OX:


$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b),$$

где $2a$ - длина большой оси эллипса, $2b$ - длина малой оси эллипса.

$F_1(-c; 0)$, $F_2(c; 0)$ - фокусы эллипса,

$a^2 = b^2 + c^2$ - соотношение между a , b и c ,

$e = \frac{c}{a} < 1$ - эксцентриситет эллипса.




Каноническое уравнение эллипса, фокусы которого лежат на оси ОУ:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad (a < b)$$

где $2a$ - длина малой оси эллипса, $2b$ - длина большой оси эллипса,
 $F_1(0;-c)$, $F_2(0;c)$ - фокусы эллипса,

$b^2 = a^2 + c^2$ - соотношение между параметрами a , b и c ,

$e = \frac{b}{c} < 1$ - эксцентриситет эллипса.



Каноническое уравнение гиперболы, фокусы которой лежат на оси OX:


$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b),$$

где $2a$ - длина действительной оси гиперболы, $2b$ - длина мнимой оси гиперболы.

$F_1(-c;0)$, $F_2(c;0)$ - фокусы гиперболы,

$a^2 = c^2 - b^2$ - соотношение между a , b и c ,

$e = \frac{a}{c} > 1$ - эксцентриситет гиперболы.




Каноническое уравнение гиперболы, фокусы которой лежат на оси OY:

$$\frac{x^2}{b^2} - \frac{y^2}{a^2} = 1 \quad (b < a)$$

где $2b$ - длина действительной оси гиперболы, $2a$ - длина мнимой оси гиперболы.


$b^2 = c^2 - a^2$ - соотношение между a , b и c ,

$e = \frac{b}{c} > 1$ - эксцентриситет гиперболы.



Каноническое уравнение сопряжённой гиперболы:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$




Уравнение асимптот гиперболы:

$$y = \pm \frac{b}{a} x$$

Каноническое уравнение параболы, у которой фокус которой лежит на оси ОХ, ветви направлены вправо: $x = py^2$,


где p - параметр параболы, $F(\frac{p}{2}; 0)$ - фокус параболы, $x = -\frac{p}{2}$ - уравнение директрисы параболы.



Каноническое уравнение параболы, у которой фокус которой лежит на оси ОХ, ветви направлены влево:

$$x = -py^2,$$


где p - параметр параболы, $F(-\frac{p}{2}; 0)$ - фокус параболы, $x = \frac{p}{2}$ - уравнение директрисы параболы.



Каноническое уравнение параболы, у которой фокус которой лежит на оси ОУ, ветви направлены вверх:

$$y = px^2,$$


где p - параметр параболы, $F(0; \frac{p}{2})$ - фокус параболы, $y = -\frac{p}{2}$ - уравнение директрисы параболы.



Каноническое уравнение параболы, у которой фокус которой лежит на оси ОУ, ветви направлены вниз:

$$y = -px^2,$$

где p - параметр параболы, $F(0; -\frac{p}{2})$ - фокус параболы, $y = \frac{p}{2}$ - уравнение директрисы параболы.



2. Методика решения типовых задач

2.1 По уравнению окружности $x^2 - 2x + y^2 + 4y - 4 = 0$ найти координаты центра и радиус окружности. Выполнить чертеж.

Решение:

$$\underline{x^2 - 2x} + \underline{y^2 + 4y} - 4 = 0$$

Дополним суммы $\underline{x^2 - 2x}$ и $\underline{y^2 + 4y}$ до квадратов суммы и разности. Для этого прибавим к первой сумме 1, ко второй 4, затем их вычтем, получим квадрат разности и квадрат суммы:

$\underline{x^2 - 2x + 1} + \underline{y^2 + 4y + 4} - 4 - 1 - 4 = 0$. Свернем подчеркнутые алгебраические суммы в квадрат разности и квадрат суммы, соответственно, получим:

$(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 9$. Значит, центр окружности в точке $(1; -2)$; $R=3$.

2.2 Составить уравнение эллипса, фокусы которого находятся в точках $(-4; 0)$ и $(4; 0)$, а эксцентриситет $e = 0,8$.

Решение. Фокусы эллипса лежат на оси OX , поэтому $a > b$. Запишем каноническое уравнение эллипса

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

и найдём a и b из системы уравнений

$$\begin{cases} c^2 = a^2 - b^2, \\ \frac{c}{a} = 0,8 \end{cases}$$

По условию $c = 4$, тогда имеем

$$\begin{cases} 4^2 = a^2 - b^2, \\ \frac{4}{a} = 0,8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a^2 - b^2 = 16, \\ a = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = 3, \\ a = 5 \end{cases}$$

таким образом, искомое уравнение эллипса имеет вид

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$$

2.3. Составить уравнение гиперболы, если её асимптоты заданы уравнениями $y = \pm \frac{\sqrt{6}}{3}x$ и она проходит через точку $(6; -4)$.

Решение. Подставим в каноническое уравнение гиперболы координаты заданной точки, и воспользовавшись из уравнения асимптот гиперболы соотношением $\frac{b}{a} = \frac{\sqrt{6}}{3}$, получим систему для определения a и b :

$$\begin{cases} \frac{6^2}{a^2} - \frac{(-4)^2}{b^2} = 1, \\ \frac{b}{a} = \frac{\sqrt{6}}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 36b^2 - 16a^2 = a^2b^2, \\ b = \frac{a\sqrt{6}}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a^2 = 12, \\ b^2 = 8 \end{cases}$$

тогда искомое уравнение гиперболы имеет вид:

$$\frac{x^2}{12} - \frac{y^2}{8} = 1.$$

2.4 Составить уравнение параболы с вершиной в начале координат, симметричной относительно оси OY и проходящей через точку $A(4;2)$.

Решение. Т.к. парабола симметрична оси OY и проходит через точку, лежащую в I координатной четверти, то её уравнение имеет вид

$$y = px^2.$$

Для нахождения параметра p подставим в уравнение параболы координаты данной точки, получим

$$2 = 16p \Rightarrow p = \frac{1}{8},$$

следовательно, искомое уравнение параболы имеет вид: $y = \frac{x^2}{16}$.

3. Порядок выполнения практической работы

- 3.1 Изучить краткие теоретические сведения.
- 3.2 Решить задания своего варианта (Приложение)
- 3.3 Ответить на контрольные вопросы

4. Содержание отчёта

- 4.1 Тема и цель работы.
- 4.2 Решение заданий.
- 4.3 Ответы на контрольные вопросы.

5. Контрольные вопросы

- 5.1 Дайте определение окружности.
- 5.2 Запишите каноническое уравнение окружности.
- 5.3 Дайте определение эллипса.
- 5.4 Запишите каноническое уравнение эллипса
- 5.5 Чему равен эксцентриситет эллипса.
- 5.6 Запишите соотношение между параметрами a , b и c для эллипса.
- 5.7 Дайте определение гиперболы.
- 5.8 Запишите каноническое уравнение гиперболы, фокусы которой находятся на оси OX ; на оси OY .
- 5.9 Чему равен эксцентриситет гиперболы?
- 5.10 Запишите уравнения асимптот гиперболы.
- 5.11 Какая гипербола называется равносторонней? Запишите каноническое уравнение равносторонней гиперболы и уравнения её асимптот.
- 5.12 Какие гиперболы называются сопряжёнными, запишите уравнения сопряжённых гипербол.
- 5.13 Дайте определение параболы.
- 5.14 Запишите все виды канонических уравнений парабол, вершины которых лежат в начале координат и которые симметричны относительно осей координат. Сделайте соответствующие чертежи.

6. Список справочной литературы

- 6.1 Дадаян А.А. Математика: Учебник для СПО.- М.: Инфра-М, 2019.- 544с.
- 6.3 Конспект теоретических занятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Вариант №1	Вариант №2
<p>№1. Определить координаты центра M_0 и радиус окружности: $x^2+y^2+4x+4y+3=0$</p> <p>№2. Составить уравнение эллипса и найти координаты его фокусов, если длина большой полуоси эллипса равна 10, $e = 0,6$, а фокусы эллипса лежат на оси OX.</p> <p>№3. Гипербола задана уравнением $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = 1$. Найти координаты фокусов гиперболы, длины действительной и мнимой осей, эксцентриситет и уравнение асимптот гиперболы.</p> <p>№4. Составить уравнение параболы и найти координаты её фокуса, если директриса параболы $x = -3$. Сделать чертёж.</p>	<p>№1. Определить координаты центра M_0 и радиус окружности: $x^2+y^2+2x-2y+1=0$.</p> <p>№2. Составить уравнение эллипса и найти координаты его вершин, если расстояние между фокусами эллипса равно 8, $e = 0,8$, а фокусы эллипса лежат на оси OX.</p> <p>№3. Гипербола задана уравнением $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$. Найти координаты фокусов гиперболы, длины действительной и мнимой осей, эксцентриситет и уравнения асимптот гиперболы.</p> <p>№4. Составить уравнение параболы и найти координаты её фокуса, если директриса параболы $y = 5$. Сделать чертёж</p>
Вариант №3	Вариант №4
<p>№1. Определить координаты центра M_0 и радиус окружности: $x^2+y^2-4x+2y-15=0$</p> <p>№2. Составить уравнение эллипса и найти координаты его фокусов, если длина малой оси эллипса равна 12, $e = 0,4$, а фокусы эллипса лежат на оси OX.</p> <p>№3. Гипербола задана уравнением</p>	<p>№1. Определить координаты центра M_0 и радиус окружности: $x^2+y^2-4x+16y-5=0$.</p> <p>№2. Составить уравнение эллипса и найти длины его осей, если расстояние между фокусами эллипса равно 14, $e = 0,2$, а фокусы эллипса лежат на оси OX.</p> <p>№3. Гипербола задана уравнением</p>

$\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{16} = 1.$ <p>Найти координаты фокусов гиперболы, длины действительной и мнимой осей, эксцентриситет и уравнение асимптот гиперболы.</p> <p>№4. Составить уравнение параболы и найти координаты её фокуса, если директриса параболы $y = -2$. Сделать чертёж.</p>	$\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{4} = 1.$ <p>Найти координаты фокусов гиперболы, длины действительной и мнимой осей, эксцентриситет и уравнения асимптот гиперболы.</p> <p>№4. Составить уравнение параболы и найти координаты её фокуса, если директриса параболы $x = 6$. Сделать чертёж</p>
Вариант №5	Вариант №6
<p>№1. Определить координаты центра M_0 и радиус окружности: $x^2 + y^2 - 12x + 11 = 0$.</p> <p>№2. Написать уравнение эллипса, если $2c = 8$, $e = 0,8$.</p> <p>№3. Написать уравнение гиперболы, фокусы которой лежат на оси OX, если $c = 7$, $e = \frac{7\sqrt{6}}{12}$.</p> <p>№4. Написать уравнение параболы, имеющей вершину в начале координат, симметричной относительно оси OX и проходящей через точку $A(-3;1)$</p>	<p>№1. Определить координаты центра M_0 и радиус окружности: $x^2 + y^2 - 6x + 8y = 0$</p> <p>№2. Написать уравнение эллипса, у которого фокусы имеют координаты $(2\sqrt{5};0)$ и $(-2\sqrt{5};0)$, а сумма полуосей равна 10.</p> <p>№3. Написать уравнение гиперболы, асимптотами которой служат прямые $y = \pm \frac{3}{5}x$ и фокусы которой имеют координаты $(\pm 2;0)$.</p> <p>№4. Написать уравнение параболы с вершиной в начале координат, симметричной относительно оси OY и проходящей через точку $A(-2;-4)$</p>

Практическое занятие №8

Тема: Вычисление пределов. Нахождение точек разрыва функции.

Цель работы: получить практические навыки вычисления первого и второго замечательных пределов.

1. Краткие теоретические сведения

1. Число A называется **пределом функции** $y = y(x)$ при x , стремящемся к a , если для любого положительного числа ε существует такое положительное число δ , зависящее от ε , что при всех $x \in (b; c)$, удовлетворяющих неравенству

$$|x - a| < \delta$$

выполняется неравенство

$$|y(x) - A| < \varepsilon.$$

2. Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ имеют пределы при x , стремящемся к a , т.е.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A, \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = B,$$

тогда справедливы следующие теоремы:

1. **Предел суммы (разности) двух (или более) функций равен сумме (разности) пределов каждой из этих функций.**

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \pm g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x) = A \pm B$$

2. **Предел произведения двух (или более) функций равен произведению пределов каждой из этих функций.**

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x) = A \cdot B$$

Следствие.

Постоянный множитель можно выносить за знак предела.

$$\lim_{x \rightarrow a} C \cdot f(x) = C \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

3. **Предел частного двух функций равен частному пределов каждой из этих функций.**

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{A}{B}.$$

(в этом случае предполагается, что функция $g(x) \neq 0$ в достаточно малой окрестности точки a и $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$).

4. Если существует $\lim_{x \rightarrow a} \varphi(x)$ и $y(\varphi(x))$ - элементарная функция, то

$$\lim_{x \rightarrow a} y(\varphi(x)) = y\left(\lim_{x \rightarrow a} \varphi(x)\right)$$

Замечание. Число, к которому в пределе функции стремится переменная x , называется *предельным значением* переменной; выражение, стоящее под знаком \lim , называется *предельным выражением*.

Предел функции считается вычисленным, если при подстановке в предельное выражение предельного значения переменной получают конечное число или бесконечность. В большинстве случаев при вычислении пределов функций подстановка предельного значения переменной в предельное выражение приводит к так называемым *неопределённостям*, т.е. не даёт в результате конечного числа или ∞ . Тогда предел функции вычисляют с помощью различных специальных приёмов в зависимости от типа неопределённости.

Типы неопределённостей:

$$\frac{\infty}{\infty}, \quad \frac{0}{0}, \quad 1^{\infty}, \quad \infty - \infty, \quad 0^{\infty}, \quad 0 \cdot \infty$$

СРАВНЕНИЕ БЕСКОНЕЧНО МАЛЫХ. ПРИНЦИП ЗАМЕНЫ ЭКВИВАЛЕНТНЫМИ

Величина (функция) $\alpha(x)$ называется *бесконечно малой* при $x \rightarrow a$, если

$$\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = 0.$$

Теорема (связь между пределом функции и бесконечно малой).

Если функция $y = y(x)$ при $x \rightarrow a$ имеет пределом число A , то функцию $y = y(x)$ можно представить в виде суммы числа A и бесконечно малой $\alpha(x)$ при $x \rightarrow a$, т.е.

$$\lim_{x \rightarrow a} y(x) = A \quad \Rightarrow \quad y(x) = A + \alpha(x)$$

Свойства бесконечно малых функций:

1. Сумма или разность двух бесконечно малых функций есть функция бесконечно малая.
2. Произведение бесконечно малой функции на функцию ограниченную есть бесконечно малая функция.

Бесконечно малые функции $\alpha(x)$ и $\beta(x)$ при $x \rightarrow a$ можно сравнить между собой, вычислив предел их отношения.

1. Если $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$, то $\alpha(x)$ есть бесконечно малая более высокого порядка, чем $\beta(x)$.

2. Если $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \infty$, то $\alpha(x)$ есть бесконечно малая низшего порядка, чем $\beta(x)$.

3. Если $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = c \neq 0$, то $\alpha(x)$ есть бесконечно малая того же порядка, что и $\beta(x)$.

В частности, если $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1$, то $\alpha(x)$ и $\beta(x)$ называются **эквивалентными бесконечно малыми** ($\alpha \approx \beta$).

Вычисление некоторых пределов заметно упрощается, если пользоваться

принципом замены эквивалентными:

при нахождении предела дроби можно бесконечно малые множители, стоящие в числителе или в знаменателе, заменять эквивалентными величинами.

Некоторые, наиболее часто применяемые эквивалентности:

$$\begin{array}{ll} \sin x \approx x & (x \rightarrow 0) \\ \arcsin x \approx x & (x \rightarrow 0) \\ \operatorname{tg} x \approx x & (x \rightarrow 0) \\ \operatorname{arctg} x \approx x & (x \rightarrow 0) \\ 1 - \cos x \approx \frac{x^2}{2} & (x \rightarrow 0) \\ \sqrt[n]{1+x} - 1 \approx \frac{x}{n} & (x \rightarrow 0) \\ a^x - 1 \approx x \ln a & (x \rightarrow 0) \\ e^x - 1 \approx x & (x \rightarrow 0) \\ \log_a(x+1) \approx \frac{x}{\ln a} & (x \rightarrow 0) \\ \ln(1+x) \approx x & (x \rightarrow 0) \end{array}$$

I специальный (замечательный) предел

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Этот предел позволяет заменять функцию синус при достаточно малых значениях аргумента самим аргументом, т.е. $\sin x \approx x$ при $x \rightarrow 0$.

Для более общего случая I специальный (замечательный) предел имеет вид:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin u(x)}{u(x)} = 1, \quad \text{где} \quad \lim_{x \rightarrow a} u(x) = 0$$

II специальный (замечательный) предел

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$

или

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

Функция $f(x)$ называется **непрерывной** в точке x_0 , если эта функция определена в некоторой окрестности точки x_0 и существует предел $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Если при каком-либо значении x_0 не выполняются указанные условия, то точка x_0 называется **точкой разрыва** функции $f(x)$.

Если функция непрерывна в каждой точке некоторого промежутка, то она непрерывна на этом промежутке.

Различают точки разрыва I и II рода. Точка x_0 называется **точкой разрыва I рода**, если для нее существуют конечные пределы $\lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x) = f(x_0 - 0)$ и $\lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x) = f(x_0 + 0)$ и они не равны между собой.

Все остальные точки разрыва носят название **точек разрыва II рода**.

Если $f(x_0 - 0) = f(x_0 + 0)$, то точка разрыва x_0 называется **устранимой**.

2. Методика решения типовых задач

2.1 Пример 1. Вычислить $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\sin 7x}$.

Решение. В данном предельном выражении присутствуют тригонометрические функции, в таком случае для раскрытия неопределённости $\frac{0}{0}$

используется $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

В данном примере т.к. при $x \rightarrow 0$, аргументы $5x$ и $7x$ также стремятся к 0, поэтому можно заменить тригонометрические функции, стоящие в предельном выражении, их аргументами:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\sin 7x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x}{7x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5}{7} = \frac{5}{7}.$$

2.2 Пример 2. Вычислить $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} 6x}{\sin 8x}$.

Решение. Выполним преобразование предельного выражения:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} 6x}{\sin 8x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 6x}{\cos 6x} \cdot \frac{1}{\sin 8x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6x}{8x \cdot \cos 8x} = \\ &= \frac{3}{4} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos 8x} = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{\cos 0} = \frac{3}{4} \cdot 1 = \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

2.3 Пример 3. Вычислить $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-3}{x+1} \right)^{x-1}$.

Решение. Предельное выражение $\left(\frac{x-3}{x+1} \right)^{x-1}$ при $x \rightarrow \infty$ представляет собой степень, основание которой стремится к 1, а показатель к ∞ , т.е. в данном случае имеем неопределённость типа 1^∞ , для раскрытия которой применяю

II специальный (замечательный) предел

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x \right)^{\frac{1}{x}} = e \quad \text{или} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = e.$$

Преобразуем выражение таким образом, чтобы применить II замечательный предел, для этого выделим из дроби целую часть:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-3}{x+1} \right)^{x-1} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{(x+1)-4}{x+1} \right)^{x-1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-4}{x+1} \right)^{x-1} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{-4}{x+1} \right)^{\frac{x+1}{-4}} \right]^{\frac{-4}{x+1} \cdot (x-1)} = e^{-4 \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x-1}{x+1}} = e^{-4 \cdot 1} = e^{-4} = \frac{1}{e^4}. \end{aligned}$$

2.4 Пример 4. Вычислить $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin^2 x}$.

Решение. В предельном выражении стоит отношение двух бесконечно малых

функций. Для вычисления данного предела воспользуемся принципом замены эквивалентными:

$$\sin^2 x = (\sin x)^2 \approx x^2, \quad 1 - \cos x \approx \frac{x^2}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Пример 5. Вычислить $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1 - \sin 2x} - 1)(e^{\arctg^2 3x} - 1)}{(1 - \cos 2x) \ln(1 + 5x)}$

Решение. Применим принцип замены эквивалентными. При $x \rightarrow 0$

$$\sin x \sim \operatorname{tg} x \sim \arcsin x \sim \operatorname{arctg} x \sim x, \quad 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}, \quad \ln(1 + x) \sim x,$$

$$a^x - 1 \sim x \cdot \ln a, \quad e^x - 1 \sim x, \quad \log_a(1 + x) \sim \frac{x}{\ln a}, \quad \ln(1 + x) \sim x, \quad (1 + x)^p - 1 \sim px, \quad p > 0.$$

Для решаемой задачи

$$\sqrt{1 - \sin 2x} - 1 = (1 - \sin 2x)^{1/2} - 1 \sim \frac{1}{2}(-\sin 2x) \sim \frac{1}{2}(-2x) = -x,$$

$$e^{\arctg^2 3x} - 1 \sim (\arctg 3x)^2 \sim (3x)^2 = 9x^2, \quad 1 - \cos 2x = 2 \sin^2 x \sim 2x^2, \quad \ln(1 + 5x) \sim 5x.$$

Следовательно,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1 - \sin 2x} - 1)(e^{\arctg^2 3x} - 1)}{(1 - \cos 2x) \ln(1 + 5x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(-x) \cdot 9x^2}{2x^2 \cdot 5x} = -\frac{9}{10}.$$

3. Порядок выполнения практической работы

- 3.1 Изучить краткие теоретические сведения.
- 3.2 Решить задания своего варианта (Приложение)
- 3.3 Ответить на контрольные вопросы

4. Содержание отчёта

- 4.1 Тема и цель работы.
- 4.2 Решение заданий.
- 4.3 Ответы на контрольные вопросы.

5. Контрольные вопросы

- 5.1 Дайте определение предела функции.
- 5.2 Сформулируйте основные теоремы о пределах.
- 5.3 Запишите первый специальный предел. Когда его применяют?
- 5.4 Запишите второй специальный предел. Для раскрытия какой неопределённости его применяют?

5.5 Дайте определение точек разрыва функции.

5.6 Какого рода бывают точки разрыва?

6.Список справочной литературы

6.1 Алексеева Е.В. «Функции. Пределы. Непрерывность»: учебное пособие для студентов 1-го , 2-го курса технических специальностей по разделу дисциплин «Элементы высшей математики», «Математика»

6.2 Конспект теоретических занятий

Вычислить пределы следующих функций:

ВАРИАНТ 1	ВАРИАНТ 2
<p>1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{\sin x}$</p> <p>2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - \sin x}{x \sin^2 x}$</p> <p>3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 4x}{3x^2}$</p> <p>4. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1+x^2}{3+x^2} \right)^{4x^2}$</p> <p>5. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x-1}{3x+5} \right)^{\frac{1}{5x}}$</p>	<p>1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(e^x - 1)}{1 - \cos x}$</p> <p>2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - \sin x}{x^3}$</p> <p>3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x \sin x}{x^2}$</p> <p>4. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2}{x-3} \right)^{5x}$</p> <p>5. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{6x-5}{6x-7} \right)^{2x-1}$</p>
ВАРИАНТ 3	ВАРИАНТ 4
<p>1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{\ln(1-6x)}$</p> <p>2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x + \sin x}{2x}$</p> <p>3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 2x}{x^2}$</p> <p>4. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x^2+1}{3x^2-2} \right)^{5x^2}$</p> <p>5. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{2x+3}{2x-5} \right)^{\frac{1}{2x}}$</p>	<p>1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+2x)}{\arcsin 3x}$</p> <p>2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\sqrt{x+2} - \sqrt{2}}$</p> <p>3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^3 \frac{x}{3}}{x^3}$</p> <p>4. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-5}{2x+3} \right)^{7x}$</p> <p>5. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{5x-1}{5x+3} \right)^{3x}$</p>

Найти точки разрыва функций, определить их характер.

Вариант 1.

$$1. Y = \begin{cases} 3, & \text{если } x < -1; \\ 2x + 1, & \text{если } -1 \leq x < 2; \\ 3 - x, & \text{если } x \geq 2. \end{cases} \quad 2. Y = \frac{4x}{2x-6}.$$

Вариант 2.

$$1. Y = \begin{cases} 3x + 4, & \text{если } x \leq -2; \\ 1, & \text{если } -2 < x \leq 3; \\ 3 - x, & \text{если } x > 3. \end{cases} \quad 2. Y = \frac{2x}{12-6x}$$

Вариант 3.

$$1. Y = \begin{cases} 5 + x, & \text{если } x < -3; \\ 4, & \text{если } -3 \leq x \leq 1; \\ 3x - 1, & \text{если } x > 1. \end{cases} \quad 2. Y = \frac{4}{2x-4}$$

Вариант 4.

$$1. Y = \begin{cases} 2 - x, & \text{если } x \leq -1; \\ 2x - 1, & \text{если } -1 < x < 4; \\ 3, & \text{если } x \geq 4. \end{cases} \quad 2. Y = \frac{4x}{3x-15}$$

Практическое занятие №9

Тема: Дифференцирование простых и сложных функций.

Цель работы: получить практические навыки нахождения производных различных функций

1. Краткие теоретические сведения

Производной функции $y = y(x)$ называется предел отношения приращения функции (Δy) к приращению аргумента (Δx) , когда приращение аргумента стремится к нулю.

y' - обозначение производной функции $y = y(x)$.

Согласно определению

$$y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

Основные правила дифференцирования:

1. Производная постоянной величины.

$$C' = 0.$$

2. Производная суммы

$$(u \pm v)' = u' \pm v'.$$

3. Производная произведения.

$$(uv)' = u'v + uv'$$

Следствие.

$$(cu)' = cu'.$$

4. Производная частного.

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{vu' - uv'}{v^2}.$$

5. Производная сложной функции

Сложной называется функция, у которой аргумент также является функцией.

Символически сложную функцию обозначают

$$y = y(f(x)),$$

где $f(x)$ - промежуточный аргумент сложной функции y .

При нахождении производной сложной функции используют **правило дифференцирования сложной функции** и **таблицей производных сложных функций**.

Правило дифференцирования сложной функции

$$y' = y_f' \cdot f_x'$$

Практическое правило: чтобы найти производную сложной функции её надо продифференцировать как простую, сохраняя аргумент и результат умножить на производную этого аргумента.

6. Таблица производных элементарных функций.

$$1. (x^n)' = nx^{n-1}, \text{ в частности } x' = 1, (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2},$$

$$(kx + b)' = k.$$

$$2. (a^x)' = a^x \cdot \ln a, \text{ в частности } (e^x)' = e^x.$$

$$3. (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}, \text{ в частности } (\ln x)' = \frac{1}{x}.$$

$$4. (\sin x)' = \cos x.$$

$$5. (\cos x)' = -\sin x.$$

$$6. (\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$7. (\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}.$$

$$8. (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

$$9. (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$10. (\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$11. (\operatorname{arcctg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

7. Таблица производных сложных функций

$$1. (u^n)' = nu^{n-1} \cdot u', \text{ в частности } (\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}, \left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2},$$

$$\left((ax + b)^n\right)' = an(ax + b)^{n-1}$$

$$2. \left(a^u\right)' = a^u \cdot \ln a \cdot u', \text{ в частности } \left(e^u\right)' = e^u \cdot u'.$$

$$3. \left(\log_a u\right)' = \frac{u'}{u \cdot \ln a}, \text{ в частности } \left(\ln u\right)' = \frac{u'}{u}.$$

$$4. \left(\sin u\right)' = \cos u \cdot u'.$$

$$5. \left(\cos u\right)' = -\sin u \cdot u'.$$

$$6. \left(\operatorname{tg} u\right)' = \frac{u'}{\cos^2 u}$$

$$7. \left(\operatorname{ctg} u\right)' = -\frac{u'}{\sin^2 u}.$$

$$8. \left(\arcsin u\right)' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}.$$

$$9. \left(\arccos u\right)' = -\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$$

$$10. \left(\operatorname{arctg} u\right)' = \frac{u'}{1+u^2}$$

$$11. \left(\operatorname{arcctg} u\right)' = -\frac{u'}{1+u^2}$$

2. Методика решения типовых задач

2.1 Пример 1. Найти производную функции $y = 5x^3 - 3x^2 + \ln x$.

Решение. Применим последовательно правила дифференцирования производная суммы нескольких функций, вынесение постоянного множителя за знак производной и формулы из таблицы производных 2 и 4, получим:

$$\begin{aligned} y' &= \left(5x^3 - 3x^2 + \ln x\right)' = 5\left(x^3\right)' - 3\left(x^2\right)' + (\ln x)' = 5 \cdot 3x^{3-1} - 3 \cdot 2x^{2-1} + \frac{1}{x} = \\ &= 15x^2 - 6x + \frac{1}{x}. \end{aligned}$$

Пример 2. Найти производную функции $y = \sqrt{x} - \frac{5}{\sqrt[3]{x^2}} - \frac{1}{x^2}$.

Решение. Представим каждое слагаемое в правой части уравнения функции в виде степени:

$$\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}, \quad \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} = \frac{1}{x^{\frac{2}{3}}} = x^{-\frac{2}{3}}, \quad \frac{1}{x^2} = x^{-2},$$

тогда

$$\begin{aligned}y' &= \left(\sqrt{x} - \frac{5}{\sqrt[3]{x^2}} - \frac{1}{x^2} \right)' = \\&= \left(x^{\frac{1}{2}} - 5x^{-\frac{2}{3}} - x^{-2} \right)' = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1} - 5 \cdot \left(-\frac{2}{3} \right) x^{-\frac{2}{3}-1} - (-2)x^{-2-1} = \\&= \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} + \frac{10}{3}x^{-\frac{4}{3}} + 2x^{-3}\end{aligned}$$

2.2 Пример 3. Найти производную функции $y = e^x \cdot \operatorname{arctg} x$.

Решение. Применим правило дифференцирования производная частного, получим:

$$y' = (e^x \cdot \operatorname{arctg} x)' = (e^x)' \cdot \operatorname{arctg} x + e^x \cdot (\operatorname{arctg} x)' = e^x \cdot \operatorname{arctg} x + e^x \cdot \frac{1}{1+x^2}.$$

2.3 Пример 4. Найти производную функции $y = \frac{\cos x}{9^x - 3x^2}$.

Решение. Применим правило дифференцирования производная частного:

$$\begin{aligned}y' &= \left(\frac{\cos x}{9^x - 3x^2} \right)' = \frac{(\cos x)' \cdot (9^x - 3x^2) - \cos x \cdot (9^x - 3x^2)'}{(9^x - 3x^2)^2} = \\&= \frac{-\sin x \cdot (9^x - 3x^2) - \cos x \cdot (9^x \ln x - 6x)}{(9^x - 3x^2)^2}.\end{aligned}$$

2.4 Пример 5. Найти производную функции $y = \sin^3 x$

Решение. Продифференцируем данную функцию как степенную с промежуточным аргументом $\sin x$, получим:

$$y' = 3 \sin^2 x \cdot (\sin x)' = 3 \sin^2 x \cdot \cos x.$$

Пример 6. Найти производную функции $y = \ln \cos x$.

Решение. Продифференцируем данную функцию как логарифмическую с промежуточным аргументом $\cos x$, получим:

$$y' = \frac{1}{\cos x} \cdot (\cos x)' = \frac{-\sin x}{\cos x} = -\operatorname{tg} x.$$

Пример 7. Найти производную функции $y = \ln \sin \frac{x+2}{x}$.

Решение. Продифференцируем данную функцию как сложный логарифм, аргументом которого также является сложная функция синус:

$$y' = \left(\ln \sin \frac{x+2}{x} \right)' = \frac{1}{\sin \frac{x+2}{x}} \cdot \left(\sin \frac{x+2}{x} \right)' = \frac{1}{\sin \frac{x+2}{x}} \cdot \cos \frac{x+2}{x} \cdot \left(\frac{x+2}{x} \right)' =$$

$$= \operatorname{ctg} \frac{x+2}{x} \cdot \frac{(x+2)' \cdot x - (x+2) \cdot x'}{x^2} = \operatorname{ctg} \frac{x+2}{x} \cdot \frac{x - x - 2}{x^2} = -\frac{2}{x^2} \operatorname{ctg} \frac{x+2}{x}.$$

3. Порядок выполнения практической работы

- 3.1 Изучить краткие теоретические сведения.
- 3.2 Решить задания своего варианта (Приложение)
- 3.3 Ответить на контрольные вопросы

4. Содержание отчёта

- 4.1 Тема и цель работы.
- 4.2 Решение заданий.
- 4.3 Ответы на контрольные вопросы.

5. Контрольные вопросы

- 5.1 Дайте определение производной функцию
- 5.2 Сформулируйте правила дифференцирования.

6. Список справочной литературы

- 6.1 Алексеева Е.В. Дифференциальное исчисление функции одной переменной: учебное пособие для студентов 1-го и 2-го курса технических специальностей по разделу дисциплины «Математика»
- 6.2 Конспект теоретических занятий

Найти производные следующих функций:

ВАРИАНТ №1	ВАРИАНТ №2
<p>№1. $y = 5\sqrt{x} - \frac{2}{\sqrt[3]{x^2}} + \frac{3}{x^3} - \frac{4}{x}$</p> <p>№2. $y = \operatorname{arctg}x \cdot \ln 2x$</p> <p>№3. $y = \frac{\cos 8x}{\operatorname{ctg}x + 3x^2}$</p> <p>№4. $y = (5x^2 + e^{3x}) \cdot \operatorname{arctg}x$</p> <p>№5. $y = \ln \frac{1 + \sin 3x}{1 - \sin 3x}$</p>	<p>№1. $y = 6x^2 - \frac{5}{x^3} - \sqrt[3]{x^4} + \frac{9}{\sqrt{x}}$</p> <p>№2. $y = e^{-2x} \cdot \ln(3x + 4)$</p> <p>№3. $y = \frac{x - \sin 4x}{\sqrt{x}}$</p> <p>№4. $y = \operatorname{arctg} 6x \cdot (e^{\operatorname{tg}x} + 2)$</p> <p>№5. $y = \cos \ln(2x - x^2)$</p>
ВАРИАНТ №3	ВАРИАНТ №4
<p>№1. $y = 2\sqrt[4]{x} + 9x^2 - 5\sqrt[3]{x^2} + \frac{7}{x^2}$</p> <p>№2. $y = \arccos x \cdot e^{-3x}$</p> <p>№3. $y = \frac{\operatorname{tg} 4x}{\sin x + 5x}$</p> <p>№4. $y = (2 + 3 \arcsin 7x) \cdot (x^2 + \ln(x^2 + 1))$</p> <p>№5. $y = \sin^2 \frac{1-x}{1+x}$</p>	<p>№1. $y = 5\sqrt{x} + 3\sqrt[4]{x} - \frac{5}{x^2} + \frac{4}{\sqrt[3]{x}}$</p> <p>№2. $y = \ln(2x + 1) \cdot \operatorname{arctg}x$</p> <p>№3. $y = \frac{e^{2x} - 3}{\cos x}$</p> <p>№4. $y = (2 \arccos 3x + 5x^3) \cdot e^{\operatorname{tg}x}$</p> <p>№5. $y = \ln \sin \frac{x+2}{x}$</p>

Практическое занятие №10

Тема: Исследование функций с помощью производной. Построение графиков функций.

Цель работы: получить практические навыки исследования функции на монотонность и экстремумы, выпуклость и вогнутость, точки перегиба графика функции, составления уравнений касательной и нормали к графикам функции, нахождения асимптот графика функции.

1. Краткие теоретические сведения

Интервалом (промежутком) возрастания функции называется промежуток из области определения функции, на котором функция возрастает.

Интервалом (промежутком) убывания функции называется промежуток из области определения функции, на котором функция убывает.

Интервалы возрастания и убывания функции называются *интервалами (промежутками) монотонности* функции.

Интервалы монотонности функции можно определить с помощью первой производной.

Правило нахождения интервалов (промежутков) монотонности функции:


1. Найти область определения функции.
2. Найти производную $f'(x)$ функции, а затем определить точки x_0 , в которых производная равна 0 или ∞ (*критические точки*), т.е. решить уравнения $f'(x) = 0$ и $f'(x) = \infty$.
3. Область определения функции разбить критическими точками на числовые промежутки и определить знак $f'(x)$ в каждом из полученных числовых промежутков.
4. В тех промежутках, где $f'(x) > 0$ функция возрастает, в тех промежутках, где $f'(x) < 0$ функция убывает.

Экстремумы функции


Точка x_0 из области определения функции называется *точкой максимума*, если в некоторой окрестности этой точки выполняется условие

$$y(x_0) > y(x).$$





Точка x_0 из области определения функции называется **точкой минимума**, если в некоторой окрестности этой точки выполняется условие $y(x_0) < y(x)$.



Точки максимума и минимума функции называются *точками экстремума* функции.

Значения функции в точках максимума и точках минимума называются *максимумом* и *минимумом функции* соответственно.


Максимум и минимум функции называются *экстремумами функции*.

Правило нахождения экстремумов функции с помощью первой производной:


1. Найти область определения функции.
2. Найти критические точки x_0 функции $y = f(x)$, т.е. те точки из области определения функции, в которых $f'(x) = 0$ или $f'(x) = \infty$.
3. Найденными точками разбить область определения функции на числовые промежутки.
4. Определить знак $f'(x)$ в каждом из полученных числовых промежутков.
5. Если при переходе через критическую точку x_0 производная функции $f'(x)$ **меняет свой знак**, то точка x_0 **является точкой экстремума** функции; если **знак $f'(x)$ не меняется**, то точка x_0 **точкой экстремума не является**. При этом если при переходе через рассматриваемую точку x_0 слева направо знак $f'(x)$ **меняется с минуса на плюс**, то x_0 - **точка минимума**, если **с плюса на минус**, то x_0 - **точка максимума**.
6. Для нахождения экстремумов функции вычислить значения функции $y = f(x)$ в точках экстремума.

Интервалы выпуклости и вогнутости графика функции. Точки перегиба.

Промежуток из области определения функции, на котором график функции лежит ниже любой касательной, проведённой к графику в любой точке из этого промежутка, называется **промежутком выпуклости графика функции**.



Промежуток из области определения функции, на котором график функции лежит выше любой касательной, проведённой к графику в любой точке из этого промежутка, называется **промежутком вогнутости графика функции**.



Точка, в которой промежуток выпуклости графика функции сменяется промежутком вогнутости, называется **точкой перегиба**.

Промежутки выпуклости и вогнутости графика функции и точки перегиба находят с помощью второй производной.

Правило нахождения промежутков выпуклости и вогнутости графика функции и точек перегиба:

1. Найти область определения функции.
2. Найти вторую производную функции $y = y(x)$.
3. Найти корни уравнения $y''(x) = 0$.
4. Найденными корнями разбить область определения функции на числовые промежутки.
5. Определить знак второй производной в каждом из полученных числовых промежутков.
6. В промежутке, в котором y'' имеет **знак +**, график функции является **вогнутым**, в промежутке, в котором y'' имеет **знак -**, график функции является **выпуклым**.

Уравнения касательной и нормали к кривой:

Уравнение касательной, проведённой к графику функции $y = y(x)$ в точке с абсциссой, x_0 имеет вид:

$$y - y(x_0) = y'(x_0) \cdot (x - x_0) \quad (1)$$

Уравнение нормали, проведённой к графику функции в точке с абсциссой x_0 , имеет вид

$$y - y(x_0) = -\frac{1}{y'(x_0)} \cdot (x - x_0) \quad (2)$$

Замечание. Уравнение (2) задаёт нормаль в точке с абсциссой x_0 к графику функции $y = y(x)$, если в точке x_0 существует отличная от нуля производная $y'(x_0)$.

Если $y'(x_0) = 0$, то касательная в (\cdot) x_0 будет параллельна оси OX и иметь уравнение

$$y = y_0,$$

а нормаль в этой точке будет перпендикулярна оси OX и иметь уравнение

$$x = x_0$$

Если производная функции в точке x_0 бесконечна ($y'(x_0) = \infty$), то уравнение касательной имеет вид

$$x = x_0,$$

а уравнение нормали имеет вид $y = y_0$,

Асимптоты графика функции:

Определение. *Асимптотой* графика функции $y = y(x)$ называется прямая линия, расстояние до которой от точки кривой $y = y(x)$ стремится к нулю при неограниченном удалении от начала координат этой точки по кривой.

Различают два вида асимптот: *вертикальные* и *наклонные*, которые могут вырождаться в *горизонтальные*.

Уравнение вертикальной асимптоты графика функции $y = y(x)$ имеет вид

$$x = a,$$

где число a находят из соотношения $\lim_{x \rightarrow a} y(x) = \infty$.

Уравнение наклонной асимптоты имеет вид:

$$y = kx + b,$$

где коэффициенты k и b находят по формулам

$$k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{y(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [y(x) - kx].$$

При $k = 0$ наклонная асимптота вырождается в горизонтальную.

Замечание. Функция-многочлен асимптот не имеет.

Общая схема исследования функции и построение её графика

Общее исследование функции и построение её графика удобно выполнять по следующей схеме:

1. Найти область определения функции.
2. Найти точки пересечения графика функции с осями координат (если это не представляется затруднительным).

3. Если область определения функции является симметричным числовым множеством, выяснить обладает ли функция свойством чётности или нечётности.
4. Найти асимптоты графика функции.
5. Найти промежутки монотонности и экстремумы функции.
6. Найти интервалы выпуклости, вогнутости и точки перегиба графика функции.
7. По результатам исследования построить график функции

2. Методика решения типовых задач

2.1 Пример 1. Найти промежутки монотонности и экстремумы функции $y = 6x^4 - 8x^3 - 3x^2 + 6x$.

Решение. Область определения функции $D(y) = R$. Найдём производную функции

$$\begin{aligned} y' &= 24x^3 - 24x^2 - 6x + 6 = 6(4x^3 - 4x^2 - x + 1) = 6(4(x^3 - x^2) - (x - 1)) = \\ &= 6(4x^2(x - 1) - (x - 1)) = 6(x - 1)(4x^2 - 1) = 6(x - 1)(2x - 1)(2x + 1) \end{aligned}$$

Производная обращается в ноль при $x = -\frac{1}{2}$, $x = 0$, $x = \frac{1}{2}$. Эти точки разбивают область определения функции на 4 числовых промежутка, в каждом из которых y' сохраняет определённый знак. Найдём знаки производной в каждом из полученных промежутков:

x	$\left(-\infty; -\frac{1}{2}\right)$	$-\frac{1}{2}$	$\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$	$\frac{1}{2}$	$\left(\frac{1}{2}; 1\right)$	1	$(1; \infty)$
y'	-	0	+	0	-	0	+
y	убывает	min	возрастает	max	убывает	min	возрастает

Найдём значения функции в точках экстремума (экстремумы функции):

$$y\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{19}{8}, \quad y\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{13}{8}, \quad y(1) = 1.$$

Таким образом, максимумов функция достигает в точках $\left(-\frac{1}{2}; \frac{13}{8}\right)$ и $\left(\frac{1}{2}; \frac{13}{8}\right)$, минимума в точке $(1; 1)$.

2.2 Пример 2. Найти интервалы выпуклости и вогнутости и точки перегиба

графика функции $y = x^4 - 10x^3 + 36x^2 - 31x - 37$.

Решение. Область определения данной функции $D(y) = R$.

Найдём вторую производную функции:

$$y' = (x^4 - 10x^3 + 36x^2 - 31x - 37)' = 4x^3 - 30x^2 + 72x - 31.$$

$$y'' = (4x^3 - 30x^2 + 72x - 31)' = 12x^2 - 60x + 72.$$

Найдём нули второй производной

$$12x^2 - 60x + 72 = 0 \Rightarrow x_1 = 2, \quad x_2 = 3.$$

Полученные результаты занесём в таблицу и определим знак второй производной в каждом из полученных числовых промежутков:

x	$(-\infty; 2)$	2	$(2; 3)$	3	$(3; \infty)$
y''	+	0	-	0	+
y	график вогнутый	-19	график выпуклый	5	график вогнутый

2.3 Пример 3. Составить уравнения касательной и нормали к кривой $y = 2x^2 - 6x + 3$ в точке с абсциссой $x_0 = 1$.

Решение. Уравнение касательной к графику функции $y = y(x)$ в точке с абсциссой x_0 имеет вид

$$y - y(x_0) = y'(x_0) \cdot (x - x_0).$$

Найдём $y(x_0)$. Т.к. $x_0 = 1$, то $y(1) = 2 \cdot 1 - 6 \cdot 1 + 3 = -1$.

Найдём производную данной функции:

$$y' = (2x^2 - 6x + 3)' = 4x - 6.$$

Найдём значение производной в точке $x_0 = 1$, получим

$$y'(1) = 4 \cdot 1 - 6 = -2.$$

Подставим в формулу для уравнение касательной $x_0 = 1$, $y(x_0) = y(1) = -1$, $y'(x_0) = y'(1) = -2$, получим

$$y - (-1) = -2(x - 1),$$

после упрощения получим искомое уравнение касательной:

$$y = -2x + 1.$$

Уравнение нормали получим подставив в уравнение касательной вместо углового коэффициента -2 коэффициент $\frac{1}{2}$ (по условию перпендикулярности

двух прямых), получим

$$y = \frac{1}{2}x + 1.$$

Пример 4. Найти асимптоты кривой $y = \frac{-x^2 + 7x}{x - 3}$.


Решение. Кривая имеет вертикальную асимптоту $x = 3$, т.к.

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{-x^2 + 7x}{x - 3} = \infty.$$

Найдём наклонную асимптоту:

$$k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-x^2 + 7x}{x(x - 3)} = -1, \quad b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{-x^2 + 7x}{x - 3} + x \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-x^2 + 7x + x^2 - 3x}{x - 3} =$$
$$= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{4x}{x - 3} = 4$$

Следовательно, уравнение наклонной асимптоты имеет вид $y = -x + 4$



3. Порядок выполнения практической работы

- 3.1 Изучить краткие теоретические сведения.
- 3.2 Решить задания своего варианта (Приложение)
- 3.3 Ответить на контрольные вопросы

4. Содержание отчёта

- 4.1 Тема и цель работы.

4.2 Решение заданий.

4.3 Ответы на контрольные вопросы.

5. Контрольные вопросы

5.1 Дайте определение промежутков монотонности функции.

5.2 Сформулируйте правило нахождения промежутков монотонности функции с помощью первой производной.

5.3 Дайте определение точки максимума и точки минимума функции.

5.4 Сформулируйте определение максимума и минимума функции.

5.5 Сформулируйте правило нахождения экстремумов функции с помощью первой производной.

5.6 Дайте определение интервалов выпуклости и вогнутости графика функции и точек перегиба.

5.7 Сформулируйте правило нахождения промежутков выпуклости и вогнутости графика функции и точек перегиба.

5.8 Запишите уравнение касательной к графику функции в точке с заданной абсциссой.

5.9 Запишите уравнение нормали к графику функции в точке с заданной абсциссой.

5.10 Дайте определение асимптоты графика функции.

5.11 Перечислите виды асимптот.

5.12 Запишите уравнение вертикальной асимптоты.

5.13 В каком виде записывают уравнение наклонной асимптоты?

6. Список справочной литературы

6.1 Алексеева Е.В. Дифференциальное исчисление функции одной переменной: учебное пособие для студентов 1-го и 2-го курса технических специальностей по разделу дисциплины «Математика»

6.2 Конспект теоретических занятий

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВАРИАНТ №1	ВАРИАНТ №2
<p>№1. Найти промежутки монотонности и экстремумы функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x$</p> <p>№2. Найти промежутки выпуклости и вогнутости и точки перегиба графика функции $y = -x^4 - 2x^3 + 12x^2$</p> <p>№3. Написать уравнение касательной к кривой $y = x^3 - 3x^2 + 5x + 1$ в точке с абсциссой $x_0 = 2$.</p> <p>№4. Исследовать функцию и построить её график $y = x^3 - 3x + 2$.</p>	<p>№1. Найти промежутки монотонности и точки экстремума функции $y = 3x^2 - 8x^3$</p> <p>№2. Найти промежутки выпуклости и вогнутости и точки перегиба графика функции $y = 3x^5 - 10x^4 - 30x^3 + 12x + 7$</p> <p>№3. Написать уравнение касательной к кривой $y = -\frac{x^3}{3} + 2x^2 - 3x + 1$ в точке с абсциссой $x_0 = -2$.</p> <p>№4. Исследовать функцию и построить её график $y = x^4 - 2x^3$.</p>
ВАРИАНТ №3	ВАРИАНТ №4
<p>№1. Найти промежутки монотонности и экстремумы функции $y = 16x + 2x^2 - \frac{16}{3}x^3 - x^4$.</p> <p>№2. Найти промежутки выпуклости и вогнутости и точки перегиба графика функции $y = x^4 - 8x^3 + 18x^2 - 5x + 3$</p> <p>№3. Написать уравнение касательной нормали к кривой $y = \frac{x^3}{3} - 2x^2 - 3x + 1$ в точке с абсциссой $x_0 = 1$.</p> <p>№4. Исследовать функцию и построить её график $y = x^4 - 4x^2 + 3$.</p>	<p>№1. Найти промежутки монотонности и экстремумы функции $y = x^4 + 8x^3 + 5$</p> <p>№2. Найти промежутки выпуклости и вогнутости и точки перегиба графика функции $y = x^4 + 2x^3 - 12x^2 - 5x + 2$</p> <p>№3. Написать уравнение касательной и нормали к графику функции $y = -x^3 + 2x^2 - x + 1$ в точке с абсциссой $x_0 = -1$.</p> <p>№4. Исследовать функцию и построить её график $y = x^3 - 6x^2 + 9x - 3$</p>

Практическое занятие №11

Тема: Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными и линейных дифференциальных уравнений первого порядка.

Цель работы: сформировать навыки решения дифференциальных уравнений различных видов. Научиться находить общее и частное решение.

1. Краткие теоретические сведения.

1. Чтобы решить дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными $f_1(x)dy = f_2(y)dx$ надо :

- разделить переменные

$$\frac{f_1(x)}{f_2(x)} = \frac{g_2(y)}{g_1(y)}$$

- взять интеграл от левой и правой части

$$\int \frac{f_1(x)}{f_2(x)} dx = \int \frac{g_2(y)}{g_1(y)} dy$$

При решении линейных уравнений используют метод вариации постоянной (смотри решение примеров)

2. Методика решения типовых задач.

2.1 Задача 1. Решить уравнение $\cos x \cos y dx = \sin x \sin y dy$

Решение

$$\cos x \cos y dx = \sin x \sin y dy$$

$$\int \frac{\cos x}{\sin x} dx = \int \frac{\sin y}{\cos y} dy$$

$$\ln |\sin x| + c = -\ln |\cos y|$$

$$\ln |c * \sin x| = \ln |\cos y|^{-1}$$

$$\frac{1}{\cos y} = c * \sin x$$

$\cos y = \frac{1}{c * \sin x}$ - общее решение дифференциального уравнения.

2.2 Задача 2. Найти общее и частное решение дифференциального уравнения

~~$y = \frac{c}{1-x}$~~ при $x = -2$

Решение

$$\int \frac{dx}{1-x} = \int \frac{dx}{1+y}$$

$$-\ln|1-x| + c = \ln|1+y|$$

$$\ln|c| + \ln|\sin x| = \ln|1+y|$$

$$\ln\left|\frac{c}{1-x}\right| = \ln|1+y|$$

$$1+y = \frac{c}{1-x} \text{ - общее решение дифференциального уравнения.}$$

Найдём «с»

$$\frac{13}{12} = \frac{c}{12} = c$$

$$1+y = \frac{12}{1-x} \text{ - частное решение дифференциального уравнения.}$$

2.3 Задача 3. Решить уравнение $y' = y \cdot \operatorname{ctg} x \cdot \frac{1}{\sin x}$

Решение.

Воспользуемся подстановкой

$$y = u \cdot v$$

$$y' = u'v + uv'$$

$$u'v + uv' - uv \operatorname{ctg} x = \frac{1}{\sin x}$$

$$v(u' - u \operatorname{ctg} x) + uv' = \frac{1}{\sin x}$$

$$\begin{cases} u' - u \operatorname{ctg} x = 0 \\ uv' = \frac{1}{\sin x} \end{cases}$$

$$1) u' - u \operatorname{ctg} x = 0$$

$$\frac{du}{u} = \operatorname{ctg} x dx$$

$$\int \frac{du}{u} = \int \frac{\cos x}{\sin x} dx$$

$$\ln|u| = \ln|\sin x|$$

$$u = \sin x$$

$$2) uv = \frac{1}{\sin x}$$

$$\sin x \frac{dv}{dx} = \frac{1}{\sin x}$$

$$\int dv = \int \frac{1}{\sin^2 x} dx$$

$$v = -\operatorname{ctg} x + c$$

~~$y = \sin(x) \operatorname{ctg} x$~~ - общее решение дифференциального уравнения.

3.Порядок выполнения практической работы.

- 3.1 Изучить краткие теоретические сведения.
- 3.2 Решить задания своего варианта. (Приложение)
- 3.3 Ответить на контрольные вопросы.

4.Содержание отчёта

- 4.1 Тема и цель занятия.
- 4.2 Решение заданий.
- 4.3 Ответы на контрольные вопросы.

5.Контрольные вопросы

- 5.1 В чём состоит задача Коши?
 - 5.2 Какая подстановка используется при решении линейных уравнений?
- 6.1. Конспект лекций.

1 вариант

2 вариант

Решить дифференциальные уравнения

$$1) y' + (1+y)y = 0$$

$$2) (1+x^2)dy - 2xy dx = 0$$

$$3) (1+y) y dx - (1-y)x dy = 0$$

$$y=1 \text{ при } x=1$$

$$4) y' - y = \frac{1+x^2}{x} * e^x$$

$$5) y' - y \operatorname{ctg} x = \sin x$$

$$1) y dx - (1-y)x dy = 0$$

$$2) (1+x^2) dy - (x+y) dx = 0$$

$$3) y^2 dx e^{x dy}$$

$$y=1 \text{ при } x=0$$

$$4) y' + \frac{y}{x} = \frac{\sin x}{x}$$

$$5) y' + \frac{y}{x} = \frac{e^{-x}}{x}$$

3 вариант

4 вариант

Решить дифференциальные уравнения

$$1) y dx - (1+y) dy = 0$$

$$2) (1+y) dx - (x^2+y) dy = 0$$

$$3) \cos y dy + \sin x dx = 0$$

$$y = \frac{\pi}{4} \text{ при } x = \frac{\pi}{4}$$

$$4) y' - \frac{2y}{x} = -\frac{3}{x^2}$$

$$5) y' - y \operatorname{tg} x = \frac{1}{\cos x}$$

$$1) (1+y) dx - (2+y) dy = 0$$

$$2) (1-x^2) dx - (x+y) dy = 0$$

$$3) (1-y) dx - 2 dy = 0$$

$$y=1 \text{ при } x=1$$

$$4) y' + \frac{2y}{x+1} = (x+1)^3$$

$$5) y' - \frac{2y}{x} = x^2 e^x$$

Практическое занятие №12

Тема: Вычисление интегралов.

Цель работы: получить практические навыки нахождения неопределённых интегралов различными способами.

1.Краткие теоретические сведения

Функция $F(x)$ называется первообразной для функции $f(x)$ на некотором промежутке X , если для всех значений x из этого промежутка выполняется

$$F'(x) = f(x).$$

Теорема.

Если функция $F(x)$ является первообразной для функции $f(x)$ на некотором промежутке X , то функция

$$F(x) + C,$$

где C - произвольная постоянная, также является первообразной для $f(x)$ на этом же промежутке.

Определение.

Совокупность всех первообразных для функции $f(x)$, определённых на некотором промежутке, называется неопределённым интегралом от функции $f(x)$ на этом промежутке и обозначается символом

$$\int f(x)dx$$

Читается: «интеграл от эф от икс де икс».

По определению

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

$f(x)$ - подынтегральная функция,

$f(x)dx$ - подынтегральное выражение,

x - переменная интегрирования,

\int - знак неопределённого интеграла,

C - постоянная величина (константа).

Нахождение неопределённого интеграла по данной подынтегральной функции называется **интегрированием** этой функции.

Так как интегрирование представляет собой операцию, обратную дифференцированию, то для того чтобы проверить, правильно ли выполнено интегрирование, достаточно продифференцировать результат и получить при этом подынтегральную функцию.

Основные свойства неопределённого интеграла

1. *Производная от неопределённого интеграла равна подынтегральной функции.*

$$\left(\int f(x)dx\right)' = f(x)$$

2. *Дифференциал неопределённого интеграла равен подынтегральному выражению.*

$$d\left(\int f(x)dx\right) = f(x)dx$$

3. *Неопределённый интеграл от дифференциала некоторой функции равен этой функции плюс произвольная постоянная.*

$$\int dF(x) = F(x) + C$$

4. *Постоянный множитель можно выносить за знак интеграла.*

$$\int kf(x)dx = k \int f(x)dx$$

5. *Неопределённый интеграл от алгебраической суммы двух или более функций равен алгебраической сумме интегралов от каждой из этих функций.*

$$\int (f(x) \pm g(x))dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$$

Таблица простейших интегралов

1. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$, где $n \neq -1$, $\int \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\sqrt{x} + C$

$$2. \int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$$

$$3. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, \quad \text{в частности,} \quad \int e^x dx = e^x + C$$

$$4. \int \sin x dx = -\cos x + C \quad \int \sin ax dx = -\frac{1}{a} \cos ax + C$$

$$5. \int \cos x dx = \sin x + C \quad \int \cos ax dx = \frac{1}{a} \sin ax + C$$

$$6. \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctgx} + C$$

$$7. \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tgx} + C$$

$$8. \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C, \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C$$

$$9. \int \frac{dx}{1+x^2} = \operatorname{arctgx} + C, \quad \int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C$$

$$10. \int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$$

$$11. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2+a} \right| + C$$

Интегралы, содержащиеся в данной таблице, называются **табличными** интегралами.

Основные методы интегрирования.

Задача интегрирования принципиально труднее задачи дифференцирования. Так, например, таблица интегралов не исчерпывает даже основных элементарных функций, не говоря уже о сложных функциях.

Не существует также правил интегрирования произведения, частного, сложной и обратной функций.

Существуют лишь отдельные методы, позволяющие интегрировать отдельные классы подынтегральных функций, и выбор того или иного метода интегрирования зависит от вида подынтегральной функции.

Непосредственное интегрирование.

Непосредственное интегрирование - это такой способ интегрирования, при

котором данный интеграл с помощью различных преобразований подынтегральной функции и свойств неопределённого интеграла сводится к одному или нескольким табличным интегралам.

Метод замены переменной (способ подстановки).

Найти заданный неопределённый интеграл непосредственным интегрированием удаётся далеко не всегда, а иногда это сопряжено с большими трудностями. В таких случаях применяют другие способы интегрирования.

Одним из наиболее эффективных методов является *способ подстановки* или *замены переменной интегрирования*.

Сущность этого метода заключается в том, что путём введения новой переменной интегрирования удаётся свести заданный интеграл к новому интегралу, который сравнительно легко берётся непосредственно.

Алгоритм метода:

Пусть дан интеграл $\int f(x)dx$, который не является табличным.

1. Записываем уравнение замены

$$y = y(x),$$

где $y(x)$ - некоторая функция.

2. Находим дифференциал этой функции

$$dy = y'(x)dx.$$

3. Выражаем

$$dx = \frac{dy}{y'(x)}.$$

4. Подставим y и dy в данный интеграл:

$$\int f(x)dx = \int g(y)dy.$$

Если замена выполнена правильно, то

$$\int g(y)dy$$

будет табличным.

5. Находим

$$\int g(y)dy = F(y) + C.$$

6. Чтобы получить окончательный ответ, вместо переменной y подставляем выражение $y(x)$:

$$\int f(x)dx = F(y(x)) + C.$$

Интегрирование по частям.

Интегрирование по частям – это, практически, формула интегрирования произведения двух функций.

Хорошо известна формула дифференциала произведения двух функций:

$$d(uv) = u dv + v du$$

Проинтегрировав обе части данного равенства, получим:

$$\int d(uv) = \int u dv + \int v du ,$$

т.к.

$$\int d(uv) = uv ,$$

то

$$uv = \int u dv + \int v du ,$$

Откуда

$$\int u dv = uv - \int v du .$$

Последняя формула называется **формулой интегрирования по частям**.

Формула интегрирования по частям сводит нахождение интеграла $\int u dv$ к отысканию другого интеграла $\int v du$; её применение целесообразно в тех случаях, когда последний интеграл либо проще исходного, либо подобен ему.

При этом в качестве u берётся функция, которую проще продифференцировать, а в качестве dv берётся та часть подынтегрального выражения, которую проще проинтегрировать. Иногда формулу интегрирования по частям приходится использовать несколько раз.

При применении формулы интегрирования по частям интегралы можно разбить на 3 основные группы:

1. В интегралах вида

$$\int P(x)e^{ax} dx, \quad \int P(x)\sin ax dx, \quad \int P(x)\cos ax dx ,$$

где $P(x)$ - многочлен переменной x , a - число, полагают

$$u = P(x), \quad dv = \begin{cases} e^{ax} dx, \\ \sin ax dx, \\ \cos ax dx \end{cases}$$

2. В интегралах вида

$$\int P(x)\ln x dx, \quad \int P(x)\arcsin x dx, \quad \int P(x)\arccos x dx, \\ \int P(x)\arctg x dx, \quad \int P(x)\text{arcctg} x dx$$

полагают

$$u = \begin{cases} \ln x, \\ \arcsin x, \\ \arccos x, \\ \operatorname{arctg} x, \\ \operatorname{arcctg} x \end{cases} \quad dv = P(x)dx$$

3. В интегралах вида

$$\int e^{ax} \sin bxdx, \quad \int e^{ax} \cos bxdx$$

за u принимают любую функцию, за dv соответственно оставшуюся часть подынтегрального выражения.

2.4 Интегрирование рациональных дробей.

Рациональной дробью называется дробь вида $\frac{P(x)}{Q(x)}$, где $P(x)$ и $Q(x)$ - многочлены переменной x .

Рациональная дробь называется **правильной**, если степень многочлена $P(x)$ меньше степени многочлена $Q(x)$; в противном случае дробь называется **неправильной**.

Простейшими дробями называются правильные рациональные дроби следующего вида:

$$\frac{A}{x - a}$$

$$\frac{A}{(x - a)^m}, \text{ где } m - \text{целое число, большее единицы.}$$

$$\frac{Ax + B}{x^2 + px + q}, \text{ где квадратный трёхчлен } x^2 + px + q \text{ не имеет действительных корней.}$$

$$\frac{Ax + B}{(x^2 + px + q)^m}, \text{ где } m - \text{целое число, большее единицы и квадратный трёхчлен } x^2 + px + q \text{ не имеет действительных корней.}$$

Интегрирование дробей I и II типов производится непосредственно:

$$\int \frac{A}{x-a} dx = A \ln|x-a| + C,$$

$$\int \frac{A}{(x-a)^m} dx = \frac{A}{1-m} \cdot \frac{1}{(x-a)^{m-1}} + C.$$

Интегрирование дроби III типа было рассмотрено ранее.

Для интегрирования простейшей дроби типа IV в числителе дроби нужно выделить производную знаменателя и разложить полученный интеграл на сумму двух интегралов. Первый из них подстановкой

$$t = x^2 + px + q$$

приводится к виду

$$\int \frac{dt}{t^m} = \frac{1}{(1-m)t^{m-1}},$$

а второй имеет вид

$$\int \frac{dx}{(x^2 + px + q)^m}.$$

С помощью подстановки

$$t = x + \frac{p}{2}$$

второй интеграл преобразуется в интеграл вида

$$\int \frac{dt}{(t^2 + a^2)^m},$$

который интегрированием по частям можно свести к более простому интегралу

$$\int \frac{dt}{(t^2 + a^2)^{m-1}},$$

того же типа, но с показателем в знаменателе уже на единицу меньше.

Повторяя этот процесс, в итоге получают интеграл

$$\int \frac{dt}{t^2 + a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{t}{a}.$$

Разложение правильной рациональной дроби на сумму простейших

дробей.

Любая правильная рациональная дробь $\frac{P(x)}{Q(x)}$ может быть единственным образом представлена в виде суммы простейших рациональных дробей.

Для этого знаменатель $Q(x)$ раскладывают на множители, каждый из которых является либо степенью линейной функции $x - a$, либо степенью квадратичной функции $x^2 + px + q$, где $D < 0$.

После этого находят простейшие дроби, составляющие в сумме дробь $\frac{P(x)}{Q(x)}$.

Знаменателями таких простейших дробей могут быть линейные и квадратичные множители, входящие в разложение $Q(x)$, причём не в больших степенях, чем они входят в это разложение.

Каждому сомножителю $(x - a)^k$ разложения $Q(x)$ отвечает в разложении дроби $\frac{P(x)}{Q(x)}$ выражение вида

$$\frac{A_1}{x - a} + \frac{A_2}{(x - a)^2} + \dots + \frac{A_k}{(x - a)^k}, \quad (1)$$

а каждому сомножителю $(x^2 + px + q)^l$ - выражение вида

$$\frac{B_1x + C_1}{x^2 + px + q} + \frac{B_2x + C_2}{(x^2 + px + q)^2} + \dots + \frac{B_lx + C_l}{(x^2 + px + q)^l}. \quad (2)$$

Таким образом, получают следующие практическое **правило разложения**

правильной рациональной дроби $\frac{P(x)}{Q(x)}$ на простейшие дроби:

1. Разложить знаменатель $Q(x)$ на линейные и квадратичные множители, не имеющие действительных корней.

2. Записать разложение данной рациональной дроби $\frac{P(x)}{Q(x)}$ на простейшие дроби с неопределёнными (буквенными) коэффициентами, используя выражения (1) и (2).

3. Полученное равенство умножить на общий знаменатель.

4. Раскрыть скобки, привести подобные слагаемые и приравнять

коэффициенты при одинаковых степенях x .

5. Решить полученную систему линейных уравнений относительно искомых коэффициентов.

2. Методика решения типовых задач

2.1 Пример 1. Найти неопределённый интеграл $\int(5x^4 - 4x^2 + 3x - 1)dx$.

Решение. Применим свойство 5:

$$\int(5x^4 - 4x^2 + 3x - 1)dx = \int 5x^4 dx - 4\int x^2 dx + \int 3x dx - \int dx$$

В первых трёх интегралах применим свойство 4, в четвёртом - свойство 3, а затем табличный интеграл 1, получим:

$$\begin{aligned} \int 5x^4 dx - 4\int x^2 dx + \int 3x dx - \int dx &= 5\int x^4 dx - 4\int x^2 dx + 3\int x dx - x = \\ &= 5 \cdot \frac{x^5}{5} - 4 \cdot \frac{x^3}{3} + 3 \cdot \frac{x^2}{2} - x + C = x^5 - \frac{4x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} - x + C \end{aligned}$$

Пример 2. Найти неопределённый интеграл $\int\left(5\sqrt[3]{x^2} - \frac{3}{x^2} - \frac{2}{\sqrt[4]{x^3}} + 1\right)dx$.

Решение. Используем свойства 5 и 4, а также преобразуем каждое слагаемое подынтегральной функции в степень, получим:

$$\begin{aligned} \int\left(5\sqrt[3]{x^2} - \frac{3}{x^2} - \frac{2}{\sqrt[4]{x^3}} + 1\right)dx &= 5\int x^{\frac{2}{3}} dx - 3\int x^{-2} dx - 2\int x^{-\frac{4}{3}} dx + \int dx = \\ &= 5 \cdot \frac{3}{5} \cdot x^{\frac{5}{3}} - 3 \cdot \frac{x^{-1}}{-1} - 2 \cdot (-3) \cdot x^{-\frac{1}{3}} + x + C = 3\sqrt[3]{x^5} + \frac{3}{x} + \frac{6}{\sqrt[3]{x}} + x + C \end{aligned}$$

Пример 3. Найти неопределённый интеграл $\int \frac{3x^4 + 2x^2 - 3x + 7}{x^2} dx$.

Решение. Разделим почленно числитель дроби на знаменатель, получим

$$\int \frac{3x^4 + 2x^2 - 3x + 7}{x^2} dx = \int \left(3x^2 + 2 - \frac{3}{x} + \frac{7}{x^2}\right) dx$$

Применим свойство 5:

$$\begin{aligned} \int \left(3x^2 + 2 - \frac{3}{x} + \frac{7}{x^2} \right) dx &= \int 3x^2 dx + \int 2 dx - \int \frac{3}{x} dx + \int \frac{7}{x^2} dx = \\ &= 3 \int x^2 dx + 2 \int dx - 3 \int \frac{dx}{x} + 7 \int x^{-2} dx = 3 \cdot \frac{x^3}{3} + 2x - 3 \ln|x| + 7 \cdot \frac{x^{-1}}{-1} + C = \\ &= x^3 + 2x - 3 \ln|x| - \frac{7}{x} + C \end{aligned}$$

Пример 4. Найти неопределённый интеграл $\int e^x \left(3 - \frac{e^{-x}}{2 \cos^2 x} \right) dx$.

Решение. Раскроем в подынтегральном выражении скобки и применим табличные интегралы 3 и 6, получим:

$$\int e^x \left(3 - \frac{e^{-x}}{2 \cos^2 x} \right) dx = 3 \int e^x dx - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\cos^2 x} = 3e^x - \frac{1}{2} \operatorname{tg} x + C$$

Пример 5. Найти $\int \frac{dx}{4 + 3x^2}$.

Решение. Приведём данный интеграл к табличному интегралу 9:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{4 + 3x^2} &= \int \frac{dx}{3 \left(\frac{4}{3} + x^2 \right)} = \frac{1}{3} \int \frac{dx}{\left(\frac{2}{\sqrt{3}} \right)^2 + x^2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{3}x}{2} + C = \\ &= \frac{\sqrt{3}}{6} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{3}x}{2} + C \end{aligned}$$

2.2 Пример 1. Найти $\int e^{\frac{x}{2}} dx$.

Решение. Сделаем подстановку $x = 2t$, тогда $dx = 2tdt$. Следовательно,

$$\int e^{\frac{x}{2}} dx = \int e^t \cdot 2dt = 2 \int e^t dt = 2e^t + C = 2e^{\frac{x}{2}} + C$$

Пример 2. Найти $\int (3x - 5)^7 dx$.

Решение. Сделаем подстановку $t = 3x - 5$, тогда $dt = 3dx \Rightarrow dx = \frac{dt}{3}$, следовательно,

$$\int (3x - 5)^7 dx = \frac{1}{3} \int t^7 dt = \frac{1}{3} \cdot \frac{t^8}{8} + C = \frac{(3x - 5)^8}{24} + C .$$

Пример 3. Найти $\int x^2(3 + 2x^3)^4 dx$

Решение. Сделаем подстановку $t = 3 + 2x^3$, тогда
 $dt = 6x^2 dx \Rightarrow x^2 dx = \frac{dt}{6}$, следовательно,

$$\int x^2(3 + 2x^3)^4 dx = \frac{1}{6} \int t^4 dt = \frac{1}{6} \cdot \frac{t^5}{5} + C = \frac{(3 + 2x^3)^5}{30} + C .$$

Пример 4. Найти $\int \frac{\cos x dx}{\sqrt{1 + 2 \sin x}}$.

Решение. Подстановка $t = 1 + 2 \sin x$, тогда
 $dt = 2 \cos x dx \Rightarrow \cos x dx = \frac{dt}{2}$, получим

$$\int \frac{\cos x dx}{\sqrt{1 + 2 \sin x}} = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{\sqrt{t}} = \frac{1}{2} \int t^{-\frac{1}{2}} dt = \frac{1}{2} \cdot 2t^{\frac{1}{2}} + C = \sqrt{(1 + 2 \sin x)} + C .$$

Пример 5. Найти $\int \sin(4x + 3) dx$.

Решение. Сделаем подстановку $t = 4x + 3$, тогда $dt = 4 dx \Rightarrow dx = \frac{dt}{4}$, следовательно,

$$\int \sin(4x + 3) dx = \frac{1}{4} \int \sin t dt = -\frac{1}{4} \cos t + C = -\frac{1}{4} \cos(4x + 3) + C .$$

Пример 6. Найти $\int x^2 e^{x^3-2} dx$.

Решение. Сделаем подстановку $t = x^3 - 2$, тогда $dt = 3x^2 dx \Rightarrow x^2 dx = \frac{dt}{3}$, следовательно,

$$\int x^2 e^{x^3-2} dx = \frac{1}{3} \int e^t dt = \frac{1}{3} e^t + C = \frac{1}{3} e^{x^3-2} + C .$$

2.3 Пример 1. Найти $\int (2x + 1)e^{3x} dx$.

Решение. Данный интеграл относится к первой группе, поэтому

$$\int (2x + 1)e^{3x} dx = \left[\begin{array}{l} u = 2x + 1 \Rightarrow du = 2dx, \\ dv = e^{3x} dx \Rightarrow v = \int e^{3x} dx = \frac{1}{3}e^{3x} \end{array} \right] = \frac{1}{3}(2x + 1)e^{3x} - \frac{2}{3} \int e^{3x} dx = \frac{1}{3}(2x + 1)e^{3x} - \frac{2}{9}e^{3x} + C$$

Пример 2. Найти $\int \frac{\ln x}{x^3} dx$.

Решение. Данный интеграл относится ко второй группе, поэтому положим

$$u = \ln x \Rightarrow du = \frac{dx}{x}, \quad dv = \frac{dx}{x^3} \Rightarrow v = -\frac{1}{2x^2}.$$

Тогда по формуле интегрирования по частям находим:

$$\int \frac{\ln x}{x^3} dx = -\frac{\ln x}{2x^2} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^3} = -\frac{\ln x}{2x^2} - \frac{1}{4x^3} + C$$

Пример 3. Найти $\int (x - 5) \cos x dx$.

Данный интеграл относится к первой группе, поэтому

$u = x - 5 \Rightarrow du = dx$, $dv = \cos x dx \Rightarrow v = \sin x$, по формуле интегрирования по частям имеем

$$\int (x - 5) \cos x dx = (x - 5) \sin x - \int \sin x dx = (x - 5) \sin x + \cos x + C$$

2.4 Пример1. Найти интеграл $\int \frac{5 - 4x}{x^2 - x - 2} dx$.

Разложим знаменатель подынтегральной, рациональной правильной дроби на множители, получим

$$\int \frac{5 - 4x}{x^2 - x - 2} dx = \int \frac{5 - 4x}{(x + 1)(x - 2)} dx$$

Линейным множителям знаменателя данной дроби отвечают соответственно дроби

$$\frac{A}{x + 1} \text{ и } \frac{B}{x - 2}.$$

Следовательно,

$$\frac{5 - 4x}{(x + 1)(x - 2)} = \frac{A}{x + 1} + \frac{B}{x - 2}.$$

Умножим обе части полученного равенства на общий знаменатель, получим

$$5 - 4x = A(x - 2) + B(x - 1).$$

В правой части равенства раскроем скобки и соберём коэффициенты при различных степенях переменной x :

$$5 - 4x = (A + B)x + (B - 2A).$$

Приравняем коэффициенты при одинаковых степенях x в левой и правой частях равенства, получим линейную систему для нахождения неопределённых коэффициентов A и B :

$$\begin{cases} A + B = -4, \\ -2A + B = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -3, \\ B = -1 \end{cases}$$

Следовательно,

$$\frac{5 - 4x}{(x + 1)(x - 2)} = -\frac{3}{x + 1} - \frac{1}{x - 2},$$

и исходный интеграл равен

$$\int \frac{5 - 4x}{x^2 - x - 2} dx = -3 \int \frac{dx}{x + 1} - \int \frac{dx}{x - 2} = -3 \ln|x + 1| - \ln|x - 2| + C.$$

Пример 2. Найти интеграл $\int \frac{x^2 + 6}{x^3 - 6x^2 + 9x} dx$.

Решение. Разложим знаменатель подынтегральной дроби на множители:

$$x^3 - 6x^2 + 9x = x(x^2 - 6x + 9) = x(x - 3)^2.$$

Линейному множителю x в разложении знаменателя отвечает дробь $\frac{A}{x}$,

множителю $(x - 3)^2$ - сумма простейших дробей $\frac{B}{x - 3} + \frac{C}{(x - 3)^2}$.

Следовательно, разложение подынтегральной дроби на простейшие дроби имеет вид

$$\frac{x^2 + 6}{x(x - 3)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x - 3} + \frac{C}{(x - 3)^2}.$$

Умножив обе части полученного равенства на общий знаменатель, получим

$$x^2 + 6 = A(x - 3)^2 + Bx(x - 3) + Cx.$$

Раскрыв скобки в правой части полученного равенства и собрав коэффициенты при различных степенях переменной x , получим

$$x^2 + 6 = (A + B)x^2 + (-6A - 3B + C)x + 9A,$$

откуда получаем систему линейных уравнений для определения коэффициентов A, B, C :

$$\begin{cases} A + B = 1, \\ -6A - 3B + C = 0, \\ 9A = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = \frac{2}{3}, \\ B = \frac{1}{3}, \\ C = 5 \end{cases}$$

Следовательно, разложение подынтегральной дроби на простейшие имеет вид

$$\frac{x^2 + 6}{x(x-3)^2} = \frac{2}{3x} + \frac{1}{3(x-3)} + \frac{5}{(x-3)^2},$$

и данный интеграл равен

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 + 6}{x^3 - 6x^2 + 9x} dx &= \frac{2}{3} \int \frac{dx}{x} + \frac{1}{3} \int \frac{dx}{x-3} + 5 \int \frac{dx}{(x-3)^2} = \\ &= \frac{2}{3} \ln|x| + \frac{1}{3} \ln|x-3| - \frac{5}{x-3} + C. \end{aligned}$$

3. Порядок выполнения практической работы

- 3.1 Изучить краткие теоретические сведения.
- 3.2 Решить задания своего варианта (Приложение)
- 3.3 Ответить на контрольные вопросы

4. Содержание отчёта

- 4.1 Тема и цель работы.
- 4.2 Решение заданий.
- 4.3 Ответы на контрольные вопросы.

5. Контрольные вопросы

- 5.1 Дайте определение первообразной функции.
- 5.2 Дайте определение неопределенного интеграла.
- 5.3 Сформулируйте свойства неопределенного интеграла.
- 5.4 В чем состоит метод замены переменного.
- 5.5 Сформулируйте правило нахождения неопределенного интеграла по частям.

6.Список справочной литературы

6.1 Дадаян А.А. Математика: Учебник для СПО.- М.: Инфра-М, 2019.- 544с.

6.3 Конспект теоретических занятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВАРИАНТ 1	ВАРИАНТ 2
<p>№1. Вычислите интегралы функций:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) $\int (\frac{4}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 8)dx$ 2) $\int \sqrt[4]{x^3} dx$ <p>№2. Вычислить методом замены переменных:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) $\int \sin^2 x \cdot \cos x dx$ 2) $\int 4x^3 \cdot (x^4 - 5)^7 dx$ 3) $\int \frac{e^x}{e^x - 3} dx$ <p>№3. Вычислить, интегрируя по частям:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) $\int x \cdot e^{-3x} dx$ 2) $\int (2x^2 - 4) \cdot e^{-4x} dx$ <p>№4 Вычислить интегралы от рациональных дробей</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. $\int \frac{(5x + 2)dx}{x^2 + 2x + 10}$ 2. $\int \frac{dx}{x^2 - 4x + 13}$ 3. $\int \frac{(3 - x)dx}{(x + 5)(x - 4)}$ 	<p>№1. Вычислите интегралы функций:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) $\int x^2 \cdot (1 + 2x)dx$ 2) $\int \frac{1}{\sqrt[5]{x^2}} dx$ <p>№2. Вычислить методом замены переменных:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) $\int \sqrt{3x + 5} dx$ 2) $\int \cos^7 x \cdot \sin x dx$ 3) $\int \frac{5 \operatorname{tg} x}{\cos^2 x} dx$ <p>№3. Вычислить, интегрируя по частям:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) $\int \ln x \cdot (2x - 3) dx$ 2) $\int x^2 \cos 4x dx$ <p>№4 Вычислить интегралы от рациональных дробей</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 $\int \frac{(6x - 1)dx}{x^2 - 4x + 13}$ 2. $\int \frac{dx}{x^2 + 6x + 18}$ 3. $\int \frac{(x + 4)dx}{(x + 3)(x - 2)}$

ВАРИАНТ 3	ВАРИАНТ 4
<p>№1. Вычислите интегралы функций:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) $\int (x^4 - 8x^3 + 4x) dx$ 2) $\int \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} dx$ <p>№2. Вычислить методом замены переменных:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) $\int \cos^4 x \cdot \sin x dx$ 2) $\int \frac{8x-2}{4x^2-2x} dx$ 3) $\int e^{3x^3} \cdot x^2 dx$ <p>№3. Вычислить, интегрируя по частям:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) $\int x 3^x dx$ 2) $\int (x^2 - 3) \cdot \cos \frac{x}{3} dx$ <p>№4 Вычислить интегралы от рациональных дробей</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. $\int \frac{(6x-7)dx}{x^2+4x+8}$ 2. $\int \frac{dx}{x^2+2x+17}$ 3. $\int \frac{(3x-1)dx}{(2x+5)(x+4)}$ 	<p>№1. Вычислите интегралы функций:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) $\int (x+3)^2 dx$ 2) $\int \frac{3}{4 \cdot \sqrt[4]{x}} dx$ <p>№2. Вычислить методом замены переменных:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) $\int \frac{1}{2x-9} dx$ 2) $\int e^{-\sin x} \cdot \cos x dx$ 3) $\int \frac{e^x}{7e^x-2} dx$ <p>№3. Вычислить, интегрируя по частям:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) $\int x \sin 8x dx$ 2) $\int (3x^2 + 2) \cdot \sin 5x dx$ <p>№4 Вычислить интегралы от рациональных дробей</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. $\int \frac{(6x+1)dx}{x^2-8x+25}$ 2. $\int \frac{dx}{x^2-12x+40}$ 3. $\int \frac{(2-3x)dx}{(x-1)(3x-4)}$

Практическое занятие №13

Тема: Решение практических задач с применением свойств интегралов.

Цель работы: получить практические навыки вычисления площадей плоских фигур и объемов тел вращения.

1. Краткие теоретические сведения

Пусть на отрезке $[a; b]$ задана непрерывная функция $y = f(x) \geq 0$.

Фигура, ограниченная графиком функции $y = f(x)$, прямыми линиями, $y = 0$, $x = a$, $x = b$ называется *криволинейной трапецией*.

Определение. Предел интегральной суммы $\sum_{i=1}^n f(c_i)\Delta x_i$ при $n \rightarrow \infty$ называется *определённым интегралом* от функции $y = f(x)$ и обозначается $\int_a^b f(x)dx$, т.е.

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(c_i)\Delta x_i$$

a - нижний предел интегрирования,

b - верхний предел интегрирования,

$f(x)$ - подынтегральная функция,

$f(x)dx$ - подынтегральное выражение;

$[a; b]$ - отрезок интегрирования.

Из определения определённого интеграла вытекает его геометрический смысл: *определённый интеграл от неотрицательной функции численно равен площади криволинейной трапеции*.

Свойства определённого интеграла.

Определённый интеграл от алгебраической суммы конечного числа функций равен алгебраической сумме определённых интегралов от каждого слагаемого.

$$\int_a^b (f_1(x) \pm f_2(x))dx = \int_a^b f_1(x)dx \pm \int_a^b f_2(x)dx$$

Постоянный множитель можно выносить за знак определённого интеграла.

$$\int_a^b kf(x)dx = k \int_a^b f(x)dx$$

При перестановке местами пределов интегрирования определённый интеграл меняет свой знак на противоположный.

$$\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$$

Определённый интеграл с одинаковыми пределами равен нулю.

$$\int_a^a f(x)dx = 0$$

Отрезок интегрирования можно разбивать на части.

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

где $a < c < b$.

Формула Ньютона - Лейбница. Основные методы вычисления определённого интеграла.

$$\int_a^b f(x)dx$$

Вычисляют определённый интеграл по формуле Ньютона - Лейбница:

$$\int_a^b f(x)dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

где $F(x)$ - первообразная для функции $f(x)$.

Формула Ньютона - Лейбница применяется для вычисления определённого интеграла во всех случаях, когда может быть найдена первообразная функция $F(x)$ для подынтегральной функции $f(x)$.

Для вычисления определённого интеграла от функции $f(x)$ по формуле Ньютона - Лейбница необходимо сначала найти первообразную $F(x)$, поэтому для вычисления определённого интеграла применяют те же приёмы, что

и для нахождения неопределённого интеграла.

Замена переменной в определённом интеграле.

$$\int_a^b f(x)dx$$

При вычислении определённого интеграла $\int_a^b f(x)dx$ способом замены переменной данный интеграл с помощью подстановки $x = \varphi(t)$ или $t = \psi(x)$ преобразуется в другой определённый интеграл с новой переменной интегрирования t и являющийся табличным.

При этом старые пределы интегрирования $x_1 = a$ и $x_2 = b$ заменяются новыми пределы $t_1 = \psi(a)$, $t_2 = \psi(b)$.

Формула замены переменной в определённом интеграле выглядит следующим образом:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{t_1}^{t_2} f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt$$

В данной формуле предполагается, что функции $\varphi(t)$ и $\varphi'(t)$ непрерывны на отрезке $[t_1; t_2]$, а функция $f(\varphi(t))$ определена и непрерывна на отрезке $[t_1; t_2]$.

Замечание. В отличие от интегрирования методом замены переменной в неопределённом интеграле при таком же способе интегрирования в интеграле определённом к старой переменной интегрирования не возвращаются.

Интегрирование по частям в определённом интеграле.

Теорема. Если функции $u = u(x)$ и $v = v(x)$ имеют непрерывные производные на отрезке $[a; b]$, то имеет место формула интегрирования по частям в определённом интеграле

$$\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du$$

Замечание 1. При вычислении определённого интеграла по частям используются те же рекомендации при выборе функции u и выражения dv , что и при применении данного метода для неопределённого интеграла.

Замечание 2. При вычислении определённого интеграла по частям пределы интегрирования не пересчитываются.

Площадь криволинейной трапеции, ограниченной непрерывной кривой $y=f(x)$, двумя прямыми $x=a$ и $x=b$ и отрезком $a \leq x \leq b$ оси абсцисс, вычисляется по формуле:

$$S = \int_a^b f(x)dx, \text{ , если } f(x) \geq 0 \text{ на отрезке от } a \text{ до } b.$$

$$S = -\int_a^b f(x)dx, \text{ , если } f(x) \leq 0 \text{ на отрезке от } a \text{ до } b.$$

$$S = \int_a^b |f(x)|dx, \text{ , если } f(x) \text{ конечное число раз меняет знак на отрезке от } a \text{ до } b.$$

$$S = \int_a^b (f(x) - g(x))dx, \text{ , если площадь фигуры, ограничена двумя непрерывными кривыми } y=f(x) \text{ и } y=g(x) \text{ и двумя прямыми } x=a \text{ и } x=b, \text{ где } f(x) \geq g(x) \text{ на отрезке от } a \text{ до } b.$$

Объем тела, образованного вращением вокруг оси Oх криволинейной трапеции, ограниченной непрерывной кривой $y=f(x)$, осью абсцисс и двумя прямыми $x=a$ и $x=b$ ($a < b$), находится по формуле: $V_x = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$,

аналогично, **объем тела вращения вокруг оси Oy** криволинейной трапеции, ограниченной непрерывной кривой $x=\varphi(y)$, осью ординат и двумя прямыми $y=c$ и $y=d$ ($c < d$), находится по формуле: $V_y = \pi \int_c^d [\varphi(y)]^2 dy$,

2. Методика решения типовых задач

2.1 Непосредственное интегрирование.

Пример 1. Вычислить определённый интеграл $\int_1^2 5x^4 dx$.

Решение. Применяя свойство 2 определённого интеграла, табличный интеграл 1 и формулу Ньютона - Лейбница, имеем:

$$\int_1^2 5x^4 dx = 5 \int_1^2 x^4 dx = 5 \cdot \frac{x^5}{5} \Big|_1^2 = x^5 \Big|_1^2 = 2^5 - 1^5 = 32 - 1 = 31$$

$$\int_0^4 \left(3x - e^{\frac{x}{4}} \right) dx$$

Пример 2. Вычислить

Решение. Последовательно применим свойства 1 и 2 определённого интеграла, табличный интеграл и формулу Ньютона - Лейбница, получим:

$$\int_0^4 \left(3x - e^{\frac{x}{4}} \right) dx = 3 \int_0^4 x dx - \int_0^4 e^{\frac{x}{4}} dx = \frac{3x^2}{2} \Big|_0^4 - 4e^{\frac{x}{4}} \Big|_0^4 = \frac{3 \cdot 4^2}{2} - 4 \cdot e^{\frac{4}{4}} + 4e^{\frac{0}{4}} = 28 - 4e$$

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{1 - x \sin x}{x} dx$$

Пример 3. Вычислить

Решение. Преобразуем подынтегральную функцию, разделив почленно числитель на знаменатель, применим свойство определённого интеграла 1 и табличные интегралы, получим

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{1 - x \sin x}{x} dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{dx}{x} - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin x dx = \ln x \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} + \cos x \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = \ln \pi - \ln \frac{\pi}{2} +$$

$$\cos \pi - \cos \frac{\pi}{2} = \ln 2 - 1$$

а. Замена переменного:

$$\int_0^5 \frac{xdx}{\sqrt{1+3x}}$$

Пример 4. Вычислить

$$t = \sqrt{1+3x} \Rightarrow x = \frac{t^2 - 1}{3}, \quad dx = \frac{2t}{3} dt$$

Решение. Сделаем замену считаем пределы интегрирования:

$$t_1 = \sqrt{1+3 \cdot 0} = 1, \quad t_2 = \sqrt{1+3 \cdot 5} = 4,$$

получаем

$$\int_0^5 \frac{xdx}{\sqrt{1+3x}} = \int_1^4 \frac{\frac{t^2 - 1}{3} \cdot \frac{2t}{3} dt}{t} = \frac{2}{9} \int_1^4 (t^2 - 1) dt = \frac{2}{9} \left(\frac{t^3}{3} - t \right) \Big|_1^4 = \frac{2}{9} \left(\frac{4^3}{3} - 4 \right) -$$

$$\frac{2}{9} \left(\frac{1^3}{3} - 1 \right) = \frac{2}{9} \cdot \frac{52}{3} + \frac{4}{27} = \frac{108}{27} = 4$$

$$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sqrt{1 + \operatorname{tg} x}}{\cos^2 x} dx$$

Пример 5. Вычислить

$$t = 1 + \operatorname{tg} x \Rightarrow dt = (1 + \operatorname{tg} x)' dx = \frac{dx}{\cos^2 x} \quad \text{и}$$

Решение. Сделаем замену
найдем новые пределы интегрирования

$$t_1 = 1 + \operatorname{tg} \left(-\frac{\pi}{4} \right) = 1 - 1 = 0, \quad t_2 = 1 + \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} = 1 + 1 = 2$$

тогда получим

$$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sqrt{1 + \operatorname{tg} x}}{\cos^2 x} dx = \int_0^2 \sqrt{t} dt = \frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} \Big|_0^2 = \frac{2}{3} \sqrt{2^3} - 0 = \frac{4\sqrt{2}}{3}$$

b. Интегрирование по частям:

$$\int_1^e x \ln x dx$$

Пример 8. Вычислить

Решение. Данный интеграл относится ко второй группе, поэтому положим

$$u = \ln x \Rightarrow du = \frac{dx}{x}, \quad dv = x dx \Rightarrow v = \frac{x^2}{2}, \quad \text{тогда имеем:}$$

$$\begin{aligned} \int_1^e x \ln x dx &= \frac{x^2}{2} \ln x \Big|_1^e - \frac{1}{2} \int_1^e x^2 \cdot \frac{dx}{x} = \frac{e^2}{2} \ln e - \frac{1}{2} \ln 1 - \frac{1}{2} \int_1^e x dx = \frac{e^2}{2} - \frac{x^2}{4} \Big|_1^e = \\ &= \frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{4} (e^2 + 1) \end{aligned}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{6}} (2 - x) \sin 3x dx$$

Пример 9. Вычислить

Решение. Данный интеграл относится к первой группе интегралов, поэтому

$$u = 2 - x \Rightarrow du = -dx, \quad dv = \sin 3x dx \Rightarrow v = -\frac{1}{3} \cos 3x$$

примем

тогда получим:

$$\int_0^{\frac{\pi}{6}} (2-x) \sin 3x dx = -\frac{1}{3} (2-x) \cos 3x \Big|_0^{\frac{\pi}{6}} - \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos 3x dx = -\frac{1}{3} \left(2 - \frac{\pi}{6} \right) \cos \frac{\pi}{2} +$$

$$\frac{1}{3} (2-0) \cos 0 - \frac{1}{9} \sin 3x \Big|_0^{\frac{\pi}{6}} = 0 + \frac{2}{3} - \frac{1}{9} \sin \frac{\pi}{2} + \frac{1}{9} \sin 0 = \frac{2}{3} - \frac{1}{9} = \frac{5}{9}$$

2.4 Пример 10. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями


~~$$y = x^2 + 4x \quad y = x + 4$$~~

~~$$y = x + 4$$~~

Решение.

$$\begin{cases} y = x^2 + 4x \\ y = x + 4 \end{cases} \Rightarrow x_1 = -4, x_2 = 1$$

$$S = \int_{-4}^1 (x+4-x^2-4x) dx = \int_{-4}^1 (4-3x-x^2) dx = 4x - \frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \Big|_{-4}^1 = \left(4 - \frac{3}{2} - \frac{1}{3} \right) - \left(-16 - \frac{48}{2} + \frac{64}{3} \right) = \frac{125}{6}$$



2.5 Пример 11. Вычислить объем тела, полученного вращением вокруг оси Ox криволинейной трапеции, ограниченной гиперболой $y = \frac{4}{x}$, прямыми $x=3$, $x=12$ и осью абсцисс.

Решение. Пользуясь формулой для вычисления объема, находим

$$V_x = \pi \int_3^{12} \left[\frac{4}{x} \right]^2 dx = 16\pi \int_3^{12} \frac{dx}{x^2} = -16\pi \frac{1}{x} \Big|_3^{12} = -16\pi \left(\frac{1}{12} - \frac{1}{3} \right) = 4\pi \text{ (куб.ед.)}$$

3. Порядок выполнения практической работы

- 3.1 Изучить краткие теоретические сведения.
- 3.2 Решить задания своего варианта (Приложение)
- 3.3 Ответить на контрольные вопросы

4. Содержание отчёта

- 4.1 Тема и цель работы.
- 4.2 Решение заданий.
- 4.3 Ответы на контрольные вопросы.

5. Контрольные вопросы

- 5.1 Запишите формулу Ньютона-Лейбница.
- 5.2 Запишите формулу для вычисления площади плоской фигуры при помощи определенного интеграла.
- 5.3 Запишите формулу для вычисления объема тела вращения.

6.Список справочной литературы

- 6.1 Богомолов Н.В., Самойленко П.И. Математика, Учебник. - М: Дрофа, 2016-395с.
- 6.2 Конспект теоретических занятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВАРИАНТ №1	ВАРИАНТ №2
<p>№1. Вычислить интегралы:</p> <p>а) $\int_{-1}^1 (6x^2 - 2x - 5)dx$</p> <p>б) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{3 \sin x + 1 \cos x} dx$</p> <p>в) $\int_1^e x^3 \ln x dx$</p> <p>№2. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями. $y = 2x^2$, $y = 3x + 2$. Сделать чертеж.</p> <p>№3. Вычислить объем тела, полученного вращением вокруг оси Ох криволинейной трапеции, ограниченной кривой $y = \sqrt{x-2}$, прямыми $x=2$, $x=4$ и осью абсцисс. Сделать чертеж.</p> <p>№4 Вычислить путь, пройденный телом.</p>	<p>№1. Вычислить интегралы:</p> <p>а) $\int_1^9 \frac{x-1}{\sqrt{x}} dx$</p> <p>б) $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin x dx}{3 - \cos x}$</p> <p>в) $\int_0^5 x e^{-x} dx$</p> <p>№2. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями. $y = -x^2 - 2$, $y = -4x + 1$. Сделать чертеж.</p> <p>№3. Вычислить объем тела, полученного вращением вокруг оси Ох криволинейной трапеции, ограниченной кривой $y = \frac{3}{x}$, прямыми $x=3$, $x=6$ и осью абсцисс. Сделать чертеж.</p> <p>№4 Вычислить путь, пройденный телом.</p>

$V = 3t^2 + 1,$ $t_1 = 0, t_2 = 4$	$V = 2t^2 + t,$ $t_1 = 1, t_2 = 3.$
ВАРИАНТ №3	ВАРИАНТ №4
<p>№1. Вычислить интегралы:</p> <p>a) $\int_{-1}^1 (2x - 3x^2) dx$</p> <p>б) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x dx}{2 + \sin x}$</p> <p>в) $\int_1^{e^2} \sqrt{x} \ln x dx$</p> <p>№2. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями. $y = x^2 - 5x,$ $y = x - 5.$ Сделать чертеж.</p> <p>№3. Вычислить объем тела, полученного вращением вокруг оси Oх криволинейной трапеции, ограниченной кривой $y = -\frac{2}{x},$ прямыми $x=1, x=2$ и осью абсцисс. Сделать чертеж.</p> <p>№4. Вычислить путь, пройденный телом. $V = 6t + 4,$ $t_1 = 2, t_2 = 3.$</p> <p>.</p>	<p>№1. Вычислить интегралы:</p> <p>a) $\int_1^4 (\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}) dx$</p> <p>б) $\int_0^1 (e^x - 4)^4 e^x dx$</p> <p>в) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x dx$</p> <p>№2. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями. $y = x^2 + 6,$ $y = -6x + 1.$ Сделать чертеж.</p> <p>№3. Вычислить объем тела, полученного вращением вокруг оси Oх криволинейной трапеции, ограниченной прямой $y = 3x - 1,$ прямыми $x=1, x=3$ и осью абсцисс. Сделать чертеж.</p> <p>№4. Вычислить путь, пройденный телом. $V = t^2 - t + 3,$ $t_1 = 0, t_2 = 5.$</p>